

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก ไม้ผลัดใบ สูง 3-15 เมตร เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลอมครีม เกือบหรือแตกเป็นแผ่นบางลึกเป็นร่องแห เปลือกในสีครีม ไม้มียางขาวหรือน้ำเลี้ยง ใบ กว้าง 1.5-4 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร เดี่ยว ออกสลับเรียงเวียนหรือคล้ายเป็นกระจุกรอบข้อ รูปรีถึงรูปไข่แคบ ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ้นขอบไม่จักหรือจักน้อยๆ ขอบมักเป็นคลื่น ใบอ่อนมีขนหยกสีน้ำตาล ใบแก่เรียบ มีขนสีสนิมอย่างน้อยบนเส้นใบด้านล่าง พบน้อยที่เกลี้ยง ใบแก่สีเหลือง เส้นใบ 5-8 คู่ ค่อนข้างขนานด้านล่าง เส้นร่างแหละเอียด ก้านใบเล็กเรียว 1-2 เซนติเมตร ไม่มีหูใบ ดอกขนาดประมาณ 0.6 เซนติเมตร สีขาวถึงเหลืองอ่อนจาง ๆ สมมาตรสมบูรณ์เพศ หรือทำหน้าที่เป็นเพศเดียว ออกเป็นช่อกระจุกแตกแขนง ยาวได้ถึงประมาณ 4 เซนติเมตร ออกที่ปลายหรือใกล้ปลาย หรืออาจพบตามซอกใบบนๆ มีขนสีสนิมแน่น ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 5 มิลลิเมตร เล็กเรียวกลับเลี้ยง 5 กลีบ แยกกัน ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร รูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนซ้อนกันมีขนสีสนิม กลีบดอก 5 กลีบ กว้างประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร คล้ายแถบหนัง ปลายโค้งเชื่อมกันหลวมๆ เป็นหลอดสั้น เกสรเพศผู้ มี 5 อัน แยกกัน ยาว 3-4 มิลลิเมตร ติดตรงกับกลีบเลี้ยง อับเรณูเล็ก ไม่มีจานฐานดอก รังไข่เหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง ก้านสั้น มีขนสีสนิมแน่นทั่วไป ก้านเกสรเพศเมีย มี 1 ก้าน ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ผล ขนาด 0.8-1.3 เซนติเมตร ออกเป็นกลุ่ม มีได้ถึง 16 ผล ทรงกลมหรือรูปไข่ตามขวาง (กว้างมากกว่ายาวเล็กน้อย) มีก้านเกสรเพศเมีย สั้นติดที่ปลาย หนามันคล้ายหนังมีตุ่มเล็กๆ สุกสีเหลืองถึงส้ม แตกออกเป็น 2 ส่วนโค้ง เมล็ดสีดำ มี 8-16 เมล็ด ติดเป็นแถวตรงกลาง ขึ้นไปถึงครึ่งผล มีเนื้อหุ้มกลีบสีแดงสด เหนียว พบทั่วไปในที่โล่ง ตั้งแต่ระดับทะเลถึง 600 เมตร ทั้งตามขอบป่าชายเลน ริมฝั่งแม่น้ำป่าสักและตามชายป่าที่สูง



ข้อมูลอ้างอิง : การค้นคว้า, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/albums/72157640320713015>