


ไม้ต้น

ขนาดเล็กถึงกลาง สูงถึง 25 ม. เปลือก สีน้ำตาล อมเทา หยาบเล็กน้อย มักมีหย่อมตุ่มเกิดจากข้อดอกแก่ที่หลุดไป โคนต้นเป็นปึกเมื่อแก่ ใบ รูปรีถึงรูปไข่กลับหรือรูป ใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 4.5-7 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนแหลม หรือพบน้อยที่โคน กลม ค่อนข้างเท่ากัน เนื้อบาง มีขนนุ่มกระจาย บนเส้นกลางใบด้านล่าง หรืออาจเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 12-16 คู่ เป็นมุมแหลมชันกับเส้นกลางใบ เส้นใบย่อย เป็นร่างแห ก้านใบยาว 0.6-1 ซม. มีขนนุ่มกระจายหรือแน่น เป็นร่อง แคบด้านบน กิ่งอ่อนเล็กสีน้ำตาลเข้มถึงดำ มีขนเมื่ออ่อนต่อไปเกลี้ยง ดอก สีเขียวอมเหลืองถึงสีส้มหรือสีม่วงอมแดง ออกเป็นกระจุก มี 3-8 ดอก ตามซอกใบ ต่ำๆ บนกิ่งแก่หรือลำต้น มักออกหลายช่ออยู่รวมกัน ก้านช่อดอกยาว 2.5-4 มม. มีขนสั้น ก้านดอกเล็กยาว 1-1.8 มม. ขนสั้นแน่นกลับเกลี้ยงรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ ยาว 1-1.5 มม. แยกกัน มีขนสั้นนุ่มด้านบนและตามขอบ เกลี้ยงด้านใน กลีบดอกวงนอกรูปไข่เกือบกลม ยาวประมาณ 2 มม. โค้งกลับ มีขน คล้ายกลับเกลี้ยง กลีบดอกวงในรูปเหลี่ยมเพชร กว้าง 2-4 มม. ยาว 5-9 มม. แหลมทั้งสองด้าน มีก้านแคบยาว 3-5 มม. ด้านในไม่มีต่อม มีขน แน่นทั้งสองด้าน ดอกเกสรเพศผู้ มีเกสรเพศผู้ 40-60 อัน ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมียมีเกสรเพศเมีย 6-12 อัน มีขน มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน หรือลดรูป 4-6 อัน ผล กลมยาว ประมาณ 1.5 ซม. เกลี้ยง ไม่มีปุ่มหรือย่น มีตุ่มคล้ายหนามจำนวนมาก ก้านผลยาว 0.8-1.4 ซม. มีขนสั้นแน่นเมื่ออ่อน มีถึง 8 ผลบนก้านช่อผลยาว 1.5-2.5 ซม. สีเขียวทองถึงน้ำตาลอมเหลืองเมื่อแก่ มี 2-4(6) เมล็ด กว้างประมาณ 6 มม. ยาวประมาณ 12 มม. เรียง 2 แถว พบในป่าดิบที่ต่ำหรือป่าดิบผสมป่าไผ่ สูงถึง 400 ม. มักพบตามเขาหินปูน ป่าพรุน้ำจืด



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์, สิบสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี