

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น สูง 20-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูงถึงค่อนข้างกลม ลำต้นกลม เปลือกสีน้ำตาลคล้ำเรียบหรือแตกตื้น ๆ ตามยาว มักมีทางนูนตามขวาง ซึ่งเกิดจากแผลเป็นของใบ เปลือกชั้นในสีเหลืองอ่อนแกมสีชมพู ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาล แผ่นใบ คล้ายแผ่นหนัง แข็ง รูปรีถึงรูปขอบขนาน กว้าง 5-10 เซนติเมตร ยาว 15-35 เซนติเมตร ปลายใบมน หรือแหลมเป็นติ่งโคนใบสอบบางครั้งมน หรือหักเว้าเล็กน้อย เส้นแขนงใบโค้งเป็นระเบียบ 12-15 (20) คู่ ก้านใบยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง และตามลำต้น กระจุกละ 5-10 ดอก กลีบดอกเรียวยาวปลายแหลมกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร สีเขียวแกมเหลือง ถึงสีครีมแกมเหลืองอ่อนประดับด้วยสีม่วง ก้านดอกยาว 8-10 เซนติเมตร ผล รูปกลมรี กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 3-3.5 เซนติเมตร สุกสีแดงคล้ำ ออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจำนวนมากว่า 30 ผล ระยะเวลาการเป็นดอก-ผล ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผลแก่ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ลักษณะทางนิเวศและการกระจายพันธุ์ พบขึ้นในป่าดิบชื้นในระดับต่ำและในป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3082>