

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดกลมแน่น โคนเป็นร่อง มีพูพอนแคบเกิดขึ้นเมื่อแก่ เปลือกสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลอมแดง ขรุขระ แตกเป็นแผ่นบางไม่เท่ากัน เปลือกในสีชมพูถึงสีเหลืองอ่อนหรือสีส้มอ่อน มียางขาวบางๆ ใน ยาว 15-40 เซนติเมตร ใบประกอบแบบขนนกยดเดี่ยว ใบย่อย 1-3(4) คู่ ออกสลับหรือค่อนข้างตรงข้าม กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 6-18 เซนติเมตร(พบน้อย กว้างได้ถึง 8 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร) รูปร่างรูปไข่แคบหรือรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม ยาว โคนแหลมถึงทู่หรือพบบ้างโคนกลม มักเบี้ยวเล็กน้อย ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวถึงเขียวเข้ม เป็นมันด้านบน ด้านล่างมักมีเกล็ดเล็ก ๆ รูปไข่โดยเฉพาะใกล้หรือบนเส้นใบ บางทีมีกระจุกขนรูปดาว ที่ซอกเส้นใบ มักมีรูเล็กๆทั้งสองด้าน เส้นใบ (6)10-18 เส้น มีเส้นสั้นแซมระหว่างกลาง ฐานด้านบน เส้นใบย่อยอาจทั้งสองด้านหรือเห็นชัดด้านล่าง กิ่งเล็กเรียว มักมีสันเป็นคลื่น มีเกล็ดแน่นเมื่ออ่อน ดอก ยาว 2-5 มิลลิเมตร สีเหลืองหรือส้ม กลมหรือรูปไข่ กลับกว้าง ออกเป็นช่อดอกเล็กแตกแขนงยาวได้ ถึง 20 เซนติเมตร ตามซอกใบหรือตามกิ่งใต้แผลใบ มีเกล็ด/ขนแน่น กลีบเลี้ยงปลายจัก 1/3 ของ กลีบดอก รูปถ้วย ปลายเป็นแฉกตื้น 3-4 แฉก กลีบดอก (3)4 กลีบ กลม โคนเชื่อมติดกับหลอดเกสรเพศผู้ หลอดเกสรเพศผู้สั้นกว่ากลีบดอกเล็กน้อย รูปไข่กลับหรือรูปถ้วย ปลายจักเป็นพู่ตื้นโค้งเข้า อับเรณู 6-9 อัน ติดภายในหลอด โผล่พ้นปากหลอดเล็กน้อย ผล กว้าง 1.2-2.4 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ออกเป็นช่อ ยาว 3.5-15 เซนติเมตร มีได้ถึง 20 ผล กลมถึงรูปไข่กลับหรือรูปลูกแพร์ มักมีสันตื้น 3 สัน สีเหลืองถึงสีชมพูหรือสีแดง มีเกล็ดเล็กแน่น แก่แตก มี 3 เสี่ยง แต่ละเสี่ยงมี (0)1 เมล็ด หุ้มด้วยเนื้อสีส้มหรือสีแดงเป็นน้ำมัน กินไม่ได้

พบทั่วไปในป่าดิบที่ต่ำ หรือป่าดิบ-ป่าผลัด ใบ มักพบตามหินปูน จ.พังงา สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤค. ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี