



ไม้ต้น

ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 8-24 ม. เรือนยอดเปิดกว้าง บางทีลำต้นเป็นร่อง มีพูพอนสั้นรูปตัว L เปลือก สีน้ำตาลอมส้มถึงสีน้ำตาลอมเทา ขรุขระหรือแตกเป็นแผ่นบางแบน ชั้นกลางสีแดงหรือแดงเข้ม (บางทีไม่ชัดเจน) เปลือกในสีเหลืองอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มเมื่อถูกอากาศ มียางขาวบางๆ ไบ ยาว 15-65 ซม. ใบประกอบแบบขนนกยอเดี่ยว ใบย่อย (2)3-5 คู่ ออกสลับ กว้าง 1.5-9 ซม. ยาว 5-28 ซม. รูปรีหรือรูปใบหอกแกมขนาน ปลายเรียวแหลมยาวโคนกลมหรือแหลม เบี้ยว ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง มีขน/เกล็ดแน่น ใบแก่สีเขียวเข้มเกลี้ยงด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขน/เกล็ดรูปดาวเป็นกระจุก ส่วนมากสีน้ำตาลอมส้มหรือน้ำตาลอมแดง แต่บางทีสีออกเหลือง แน่นบนเส้นใบหลักกระจายบนผิวใบ เส้นใบ 6-19 เส้น ค่อนข้างขนานด้านบน กิ่งเล็กเรียว มีขน/เกล็ดแน่นเมื่ออ่อน ดอก ยาว 1.5-2.5 มม. กลมแบน (กว้างมากกว่าสูง) มีกลีบเหมือนตะไคร้ ช่อดอกเพศผู้ห้อย ยาว 23-50 ซม. ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ยาว 13-37 ซม. ก้านดอก ยาว 0.5-2 มม. มีเกล็ดแน่น กลีบเลี้ยงยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกลีบดอก ปลายจักลึก 5 พู มีเกล็ดแน่น กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับหรือค่อนข้างกลม หลอดเกสรเพศผู้สั้นกว่ากลีบดอก รูปถ้วยตื้น ขอบจัก 5 พู อับเรณูไฟล์ 5 อัน ติดที่ต่ำกว่าปากหลอดเล็กน้อย โผล่พ้นจากกลางดอก ผล ยาว 2-3.5 ซม. ออกเป็นช่อ ยาว 6-30 ซม. รูปไข่กลับกว้างถึงรูปรี เปลือกหนา (3-10 มม.) มีเกล็ดกระจายถึงแน่น สีเขียวอ่อน มียางขาวเมื่ออ่อน สุกสีน้ำตาลหรืออมส้ม แก่ไม่แตกคาค้น แต่จะแตกได้ง่ายตามสันเมื่อถูกกระทบ มี 3 เสี่ยง แต่ละเสี่ยงมี (0) 1 เมล็ด หุ้มด้วยเนื้อสีส้มอมชมพูใส เนื้อกินได้ พบกระจายในป่าดิบที่สมบูรณ์ หรือถูกรบกวนบ้าง ส่วนมากต่ำกว่า 300 ม. อาจพบสูงได้ถึง 1000 ม. บางทีพบบนเขาหินปูน

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน พินตา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

