

สังเคียดขนแดง

Aglaia tenuicaulis Hiern

วงศ์ MELIACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

ขนาดเล็ก สูงได้ถึง 15 ม. มักไม่แตกกิ่ง เปลือกสีเทาอ่อนถึงน้ำตาล เรียบหรือแตกเป็นชิ้นเล็กๆ เปลือกชั้นกลางสีแดงเข้ม ชั้นในสีครีมน้ำตาลอมเหลือง ไม่มียางขาว ใบ ยาวได้ถึง 130 ซม. ใบประกอบแบบขนนก ยอดเดี่ยว ออกสลับหรือกิ่งตรงข้าม ใบย่อย 3-5 คู่ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-20 ซม. รูปรีถึงรูปไข่ หรือรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลมสั้น โคนรูปกลมหรือกลม เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้มขุ่น ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนรูปดาวสีน้ำตาลแดง โดยเฉพาะบนเส้นใบ เส้นใบ 12-16 คู่ โค้งชันใกล้ขอบ ฐานขนเล็กน้อย เส้นใบย่อยจากทั้งสองด้านล่าง ก้านใบย่อย ยาวได้ถึง 2.5 ซม. กิ่งใหญ่ล่ำมีขนแน่นเมื่ออ่อน ดอก ยาวประมาณ 2 มม. สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อใหญ่ ยาว 10-20 ซม. แกนกลางใหญ่มีขนรูปดาวสีน้ำตาลแดง แน่น กลีบเลี้ยงปลายจัก ลึก 5 แฉก มีขนแน่นด้านนอก กลีบดอก 5 กลีบ ยาวประมาณ 2 มม. หลอดเกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.5 มม. รูปรี อับเรณู 5 อัน โผล่พ้นหลอดเล็กน้อย รังไข่กลมแบน ปลายมียอดเกสรเพศเมียแบน ผล กว้าง 1.2-2.5 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. รีถึงค่อนข้างกลม เปลือกนอกหนาได้ถึง 1 ซม. หนาเหนียว มียางขาว มีขนสีน้ำตาลอมส้มแน่น แก่ไม่แตก มี 1-2 ส่วน แต่ละส่วนมี 1 เมล็ด สีน้ำตาลแดง มีเนื้อใสหุ้มเมล็ด เนื้อกินได้ พบในป่าดิบที่ต่ำสูงได้ถึง 200 ม.

ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปพ.2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

