

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 12-26 ม. เรือนยอดเปิดมีกิ่งตั้ง 2-3 กิ่ง ปลายมีใบแน่นเป็นกระจุก โคนเป็นพู่พอนคล้ายแผ่นกระดานสูงได้ถึง 2 ม. เมื่อมีอายุแก่ขึ้น เปลือกมีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีขาวอมเทา หรือสีเทาอมม่วงเข้ม ค่อนข้างขรุขระ มีช่องอากาศเป็นเส้นยาวตั้งตรง แตกเป็นชิ้นใหญ่เปราะ เผยให้เห็นชั้นล่างเป็นสีอ่อน เปลือกชั้นกลางสีแดงเข้ม ชั้นในสีชมพูถึงน้ำตาลอมแดง มียางขาว ใบ ยาว 50-80(120) ซม. ใบประกอบแบบขนนกยอเดี่ยว ใบย่อย (5) 7-10 คู่ กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 8-25 ซม. พบบ้างที่ใหญ่กว่านี้ รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนเบี้ยว ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้ม เกือบดำ ด้านล่างมีขนรูปดาวสีน้ำตาลแน่นบนเส้นกลางใบและกระจายบนผิวใบ มีรูเล็กๆ ทั้งสองด้านเส้นใบ 9-19 คู่ โค้งชันใกล้ขอบ เป็นร่องด้านบน ฐานด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว 0.8-2 ซม. ก้านข้อใบยาว 14-25 ซม. ด้านบนแบน กิ่งใหญ่ต่ำ ขอบเป็นคลื่น เมื่ออ่อนมีขน/เกล็ดแน่น(อาจพบเฉพาะที่ตาดอก) ดอก ยาว 2-5 มม. (ดอกเพศผู้) หรือยาวได้ถึง 7 มม.(ดอกเพศเมีย) สีขาวหรือเหลือง รูปรี กลิ่นหอม ช่อดอกยาวได้ถึง 50 ซม. มีแกนกลางใหญ่ต่ำ ก้านดอกยาวได้ถึง 3 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1/2-2/3 -ของกลีบดอก รูปถ้วย ปลายจักลึกครึ่งกลีบเป็นแฉก 3 แฉก มักมีขนแน่น กลีบดอก 3 กลีบกว้างได้ถึง 2.5 มม. ยาวได้ถึง 4 มม. รูปรี คล้ายหมวก ปลายบางคล้ายกระดาษ มีเกล็ดรูปดาวจำนวนมาก หลอดเกสรเพศผู้สั้นกว่ากลีบดอกเล็กน้อย รูปถ้วยอับเรณู 6 อัน โผล่พ้นหลอดเล็กน้อย ผล กว้าง 4.5-8 ซม. ยาว 6-9 ซม. ออกเป็นช่อใหญ่ต่ำ ยาวได้ถึง 13 ซม. ผลกลมหรือรูปไข่กลับกว้าง เปลือกนอกหนาได้ถึง 1 ซม. หนาเหนียว มียางขาว มีขนรูปดาวสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลแดงแน่นเมื่ออ่อน สีชมพูไล่ถึงสีแดง แก่แตกมี 3(4) ส่วน แต่ละส่วนมี (0)1 เมล็ด มีเนื้อสีเหลืองหรือแดงหุ้มเมล็ดพบในป่าดิบ สูงได้ถึง 400ม. ต้นอ่อนมักขึ้นตามช่องว่างในป่าและตามชายป่า จ.พังงา สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : โทมson การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : http://www.qsb.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2825

