

ไม้ต้น

ขนาดกลาง เรือนยอดเปิด มีกิ่งตั้งชัน 2-3 กิ่ง ปลายกิ่งมีใบเป็นกระจุกแน่น เปลือก สีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลอมเทา เมื่ออ่อนแตกเป็นแผ่นเล็กบาง แก่แตกเป็นร่อง เปลือกในสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม มียางขาว (บางที่พอจางๆ) ใบ ยาวได้ถึง 135 ซม. ใบประกอบแบบขนนกยดเดี่ยว ใบย่อย 6-12 คู่ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 11-32 ซม. รูปหอกขนานถึงรูปใบหอกกลับ เนื้อคล้ายหนังบาง เขียวเข้มด้านบน ด้านล่างมีกระจุกขนสีน้ำตาลอ่อนแน่น (ขนมีแขนง 2-4 แขนงออกจากแกนกลาง) มองไม่เห็นผิวใบระหว่างขน เส้นใบ 25-40 เส้น ใบด้านข้างมีก้านข้อใบย่อยยาวได้ถึง 1 ซม. ใบปลายมีก้านใบย่อยยาวได้ถึง 2.5 ซม. ก้านข้อใบและแกนกลางใบเป็นเหลี่ยมเมื่อตัดขวาง มักมีร่อง มีขนแน่น ดอก ยาวประมาณ 2 มม. ค่อนข้างกลมช่อดอกยาวได้ถึง 45 ซม. ยาวได้ถึง 15 ซม. ไม่มีก้านดอก กลีบดอก 5 กลีบ หลอดเกสรเพศผู้ค่อนข้างกลม ปลายจักเป็นพูลึก 5 พู อับเรณู 5 อัน มีขน โผล่พ้นปากหลอด ผล ยาวได้ถึง 8 ซม. ใหญ่ เป็นช่อยาวได้ถึง 20 ซม. มีได้ถึง 15 ผล เกือบกลมถึงรูปไข่กลับกว้าง สีเขียวอมเทาอ่อน เมื่ออ่อนมีขนละเอียดแน่น สุกสีน้ำตาลและเกลี้ยง เปลือกหนา มียางสีขาว แก่ไม้แตก มี 2 ส่วน แต่ละส่วนมี 1(2) เมล็ด พบในป่าดิบที่ต่ำที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไจมอน พินตา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต – ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

