

ไม้ต้นเล็ก ไม้พุ่มเตี้ย สูงได้ถึง 12 ม. เรือนยอดทรงจั่วกระจาย ลำต้นคด เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลอมเทา เรียบถึงแตกเป็นแผ่นๆ เปลือกในสีส้มอ่อนถึงน้ำตาลแดง เนื้อเรียบ มีกลิ่นคล้ายฝรั่งดิบ ใบ ยาว 20-30(40) ซม. ใบประกอบแบบขนนกยอเดี่ยว ใบย่อย 2-3(5) คู่ กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 5-16 ซม.(ใบที่โคนเล็กและกว้างกว่า) รูปไข่ถึงรี ปลายเรียวแหลมสั้น โคนแคบค่อนข้างเบี้ยว เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบทั้งสองด้าน หรือมีขนทั่วไป เฉพาะบนเส้นกลางใบ ด้านล่างไม่มีขน ไม่มีต่อม เส้นใบ 6-8(10) คู่ แต่ละคู่ห่างกัน มีเส้นใบสั้นแซม บน ด้านบน ฐานด้านล่าง เส้นใบย่อยบนทั้งสองด้าน ใบข้างกันใบย่อยยาว 0.4-1 ซม. ปลายไม่พอง ใบปลาย มีก้านใบยาวได้ถึง 2.5 ซม. ก้านช่อใบยาว 4-8 ซม. ด้านบนบนเล็กน้อย ดอก สีขาวหรือสีเขียวย่อนดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้ต่างต้นกันออกเป็นช่อแน่นหรือแตกกิ่งกระจายยาว 2-4(8) ซม.ตามซอกใบบนๆ หรือเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่งแกนกลางช่อเกลี้ยงหรือมีขน กลีบเลี้ยงยาว1.5-2 มม. สีเขียวอมเหลือง จักจี้เป็นพู่ 5 พู่ กลีบดอกแยก 5 กลีบ กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 3-5 มม. รูปรีแคบถึงขอบขนาน ปลายแหลม ซ้อนกันในตาดอก เกสรเพศเมียมี 10 อัน ยาวประมาณ 2-3 มม. โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นขึ้นมาที่ 1/4-1/2 ของก้านเกสร เพศผู้รูปคล้ายสายเข็มขัด ปลายแตกง่าม มีอับเรณูติดระหว่างซี่พู่ รังไข่ 4-5 ซ่อ มีขนแข็งสีทองแน่น ไม่มีจานฐานดอก ก้านเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 0.5 มม.ยอดเกสรเพศเมียค่อนข้างเป็นพู 2 พู ผล ขนาด 1.3-1.8 ซม. ค่อนข้างกลม ปลายจักมีจะงอยเบี้ยวยาวประมาณ 2 มม. มีขนสีสนิมหนามันมียาวขาวบางๆ แก่ไม่แตก เมล็ด 1(2) เมล็ด รูปรี ยาว 0.8-1.3 ซม. สีน้ำตาลเข้ม เป็นมันเงา ไม่มีเยื่อหุ้ม -พบในป่าดิบที่ต่ำ สูงได้ถึง 600 ม.หรือพบในบริเวณที่ขึ้นในป่าดิบ- ป่าไผ่ จ.สุราษฎร์ธานี



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559.
ภาพประกอบ : <http://npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/m-o-p-r/meliaceae-/143-meliaceae?showall=1&limitstart=>

