

ไม้ต้นเล็กสูงได้ถึง 15 ม. เรือนยอดไม่สม่ำเสมอ เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลอมเทา หรือสีน้ำตาลแดง มีช่องอากาศมากแตกเป็นแผ่น เปลือกชั้นในสีเหลืองอ่อนมียางขาว ใบ ยาว 20-50 ซม. ใบประกอบแบบขนนกยอดเดี่ยว ใบย่อย 2-3(5) คู่ ออกกึ่งตรงข้าม กว้าง 2-7 ซม. ยาว 5-20 ซม. พบบ้างที่ใหญ่กว่านี้ กว้างได้ถึง 10 ซม. ยาวได้ถึง 30 ซม. รูปรีแคบถึงรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ้ม ใบแก่ด้านบนสีเขียวเข้ม เกือบหรือมีขนเฉพาะเส้นกลางใบ ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนรูปดาวสีน้ำตาลอมแดงปนกับขนสั้นๆสีอ่อน มีขนงไม่มากนักบนเส้นใบหลักและค่อนข้างแน่นบนผิวใบ ขนซ้อนกันแต่คงยังเห็นผิวใบระหว่างขน เส้นใบ 5-20 คู่ โค้งขึ้นใกล้ขอบ กิ่งเล็กเรียว เมื่ออ่อนมีขนรูปดาวสีน้ำตาลแดงแน่น ดอก ยาว 2-4 มม. สีขาวหรือเหลือง รูปค้อยข้าง กลม กลิ่นหอมออกเป็นช่อยาวได้ 20 ซม. ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงยาวครึ่งหนึ่งของกลีบดอก ปลายจักลึก 5 แฉก มีขนแน่น กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับหรือค้อยข้างกลม เกือบหรือห่อหุ้มอับเรณูยาวครึ่งหนึ่งของกลีบดอก มีทั้งรูปถ้วย ขอบโค้ง จักตื้น 5 พู หรือค้อยข้างกลม มีปากหลอด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม. อับเรณู 5 อัน โผล่พ้นหลอดและชี้ไปยังกลางดอก ผล กว้าง 1.2-1.8 ซม. ยาว 1.6-3 ซม. ออกเป็นช่อยาวได้ถึง 16 ซม. มีผลได้ถึง 15 ผล ผลค่อนข้างกลม มีขนรูปดาวสีน้ำตาลอมส้มหรือสีน้ำตาลแดงแน่นเมื่ออ่อนหนามัน แก่ไม่แตก มี 1-2 ส่วน แต่ละส่วนมี (0)1 เมล็ด มีเนื้อคล้ายเจลลี่สีแดงอมส้มหุ้มเมล็ด เนื้อกินได้แต่มีรสเปรี้ยว

-พบในป่าดิบที่ต่ำและป่าดิบเขา สูง จ.พังงา ภูเก็ต



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559. 792 หน้า: ภาพประกอบ
ภาพประกอบ : <http://npic-surat.com/web/index.php/2013-07-23-06-43-31/m-o-p-r/meliaceae-143-meliaceae?showall=1&limitstart=>