

Lagerstroemia floribunda Jack Var. *cuspidata* C. B. Clarke

ตะแบกไข่

วงศ์ LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น

ผลัดใบบางส่วน หรือไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 18 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มแน่น ลำต้นคด เป็นร่องที่โคน เปลือกสีครีมถึงน้ำตาลเรียบและเป็นเงา แตกเป็นแผ่นบางทิ้งรอยแผลจางเอาไว้ ใบ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-22 ซม. รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่ ปลายทู่หรือค่อนข้างแหลม โคนทู่หรือกลม ใบอ่อนสีน้ำตาลอมชมพู มีขนรูปดาวสีน้ำตาลแน่น ใบแก่เนื้อคล้ายกระดาษแข็ง สีเขียวเข้มด้านบน แล้วเริ่มเกลี้ยงทั้งสองด้าน หรือมีขนรูปดาวสีออกน้ำตาลติดทนบนเส้นใบ ใบแก่เหี่ยวย่นสีน้ำตาลอมเหลือง เส้นใบ 7-11 เส้นบางแต่เห็นชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยค่อนข้างจางห่างกัน ก้านใบยาว 3-7 มม. ดอก ยาวประมาณ 4 ซม. สีชมพูอ่อนหรือม่วง แล้วค่อยๆจางเป็นขาว ออกเป็นช่อแคบ ยาว 20-40 ซม.แตกกิ่งข้างยาว ไม่เป็นระเบียบ ตั้งขึ้นที่ปลายกิ่ง แทะขึ้นมาจากเรือนยอด มีขนรูปดาวสีสนิมแน่น ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. ตาดอกยาวประมาณ 10 มม. คล้ายลูกข่าง มี 12 สัน โคนแคบชัน ขนแน่นกลีบเลี้ยงรูปประฆัง มี 12 สัน ทุ่ ปลายเป็นพู่รูปสามเหลี่ยม 6 พู่ ไม่มีปมหรือรอยค้ำระหว่างกลีบ มีขนเป็นขุยสีน้ำตาลแน่นด้านบนนอกและครึ่งบนด้านใน กลีบดอก 6 กลีบ ยาว 12-16 ซม. รูปไข่ถึงกลม หรือรูปไข่กลับกว้าง ปลายทู่ โคนแหลมเรียวไปยังก้านสั้น ยาวประมาณ 4 มม. ย่นและขอบเป็นคลื่น แต่ไม่เป็นระบาย เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านชูอับเรณูสีชมพู อับเรณูสีเข้ม มีอันที่เล็กกว่าหลายอันมีก้านชูอับเรณูสีขาว อับเรณูสีเหลือง รังไข่ค่อนข้างกลม มีขนสีสนิมแน่น ผล ยาว 1.2-1.6 ซม. รูปขอบขนาน สีน้ำตาลเข้ม มีขนกระจาย (แน่นที่ปลายยอด) มีถ้วยกลีบเลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 ซม. ปกคลุมประมาณหนึ่งส่วนสามของผล พูกลีบเลี้ยงกางออกหรือโค้งกลับ มี 12 สัน แคบชันที่โคน มีขนแน่นพบตามที่โล่งสองฝั่งแม่น้ำ หรือบนเขาหินปูน ที่ต่ำ

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์, ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

