

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น สูงถึง 18 ม. ใบ รูปขอบขนานแกมรี พบบ้างรูปไข่หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 10-24 ซม. ปลายแหลมหรือทู่ โคนทู่หรือกลม เนื้อคล้ายหนัง เกลี้ยง เส้นใบเล็ก 6-10 คู่ ห่างไม่เท่ากัน ทำมุมแหลมชัน โค้งและไปเชื่อมกันเป็นวงห่างจากขอบใบ ค่อนข้างบน เส้นใบย่อยเป็นร่างแห เห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. เกลี้ยง ดอกเพศผู้เป็นกลุ่มแน่นยาวถึง 0.5 ซม. ตามซอกใบบนๆหรือตามกิ่งที่ไม่มีใบ มี 3-9 ดอก ก้านดอกยาว 2 มม. กลีบเลี้ยงยาว 2-3 มม. ปลายจักลึกครึ่งกลีบเป็นแฉก 4(5) แฉก ไม่ซ้อนกัน มีขน กลีบดอกยาว 0.7-1.5 มม. สีเหลืองอ่อน โคนเป็นรูปคนโท ปลายจักลึกครึ่งกลีบ เป็นแฉก 4(5) แฉก เกลี้ยง แต่มีแถบขนตรงกลางแฉกด้านนอก ด้านในเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 24-48 อัน มีขน รังไข่เป็นหมัน มีขน ดอกเพศเมียเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-2.5 ซม. ออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 3-5 ดอก ตามซอกใบก้านดอกยาวถึง 0.5 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงเหมือนในดอกเพศผู้แต่ใหญ่และจักลึกกว่า กลีบดอกยาว 1.5-2 ซม. รูปประฆังกว้าง คล้ายดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้เป็นหมัน 8-12 อัน รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียมี 4-6 อัน ยอดเกสรเพศเมียมีหลายพู ผลขนาด 4-6 ซม. ก้านผลใหญ่ยาวถึง 1 ซม. กลม ปลายทั้งสองกลมและบวม เมื่ออ่อนมีขน แก่เกลี้ยง สีส้มสดถึงน้ำตาลแห้งเมื่อสุก เปลือกหนา ภายในมียาง มี 3-8 เมล็ด เอนโดสเปิร์ม ย่น กลีบเลี้ยงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.5 ซม. จักเป็นแฉกครึ่งหนึ่งถึงสามส่วนสี่ของกลีบเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4(5) แฉก ขอบเป็นคลื่นหรือม้วน พับจีบ ขนแน่น พบในภาคใต้ 2 ไร่ Var. *malabarica* ตะโกสวน ใบแห้งด้านล่าง สีน้ำตาลอมเหลือง กลีบเลี้ยงมีขนสีอ่อนผลมีกลีบเลี้ยงโค้งกลับ Var. *siamensis* มะพลับทะเล ใบแห้งด้านล่าง สีน้ำตาลเข้ม กลีบเลี้ยงมีขนสีเข้ม ดอกเพศเมียและผลมีกลีบเลี้ยงตรง

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

