

ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 12 เมตร เรือนยอดเป็นรูปโคนเปิด เมื่อดันเล็กแตกกิ่งแฉกราบไม่เป็นพืชอิงอาศัย เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลอ่อน แตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ เปลือกในสีขาว ใบกว้าง 7-13 เซนติเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่กลับหรือรูปไข่แคบปลายเรียวแหลม โคนกลม ใบแก่เนื้อนุ่มหรือหนาคัลยหนัง สีเขียวมันด้านบน กลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบนูนเล็กน้อยหรือเป็นร่อง ด้านบน ด้านล่างกลม เส้นใบ 4-8 คู่ งาม ก้านใบยาว 0.8-2 เซนติเมตร มีหูใบเชื่อมกันเป็นเยื่อบางรอบกิ่ง ดอก 2.5-3.5 เซนติเมตร สีขาวครีมถึงสีส้มอ่อนหรือสีออกชมพู กลิ่นคล้ายเนย ออกเป็นช่อเชิงลดตก ห้อยลง ยาว 20 เซนติเมตร มีก้านช่อดอกยาว 2-8 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 2-5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว 5-7 มิลลิเมตร รูปกระดิ่ง พูจักลึกครึ่งกลีบ กลีบดอกรูปกรวย พูกลีบยาวประมาณ 1/2 ของความยาวหลอดกลีบแผ่กว้างหรือโค้งกลับ เกสรเพศผู้ยาว 1.7-2.2 เซนติเมตร อับเรณูยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ติดที่ครึ่งบนของหลอดกลีบดอก โพล์พื้นหลอดกลีบดอกเล็กน้อย รังไข่และก้านเกสรเพศเมียยาว 2-3 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียเล็ก ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร ผลยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร รูปไข่หรือรี มีก้านเกสรเพศเมียติดทนที่ปลาย ปลายแหลมสั้น สีเหลืองอ่อน ด้านนอกหนามัน มีเนื้อด้านใน เมล็ดเล็กจำนวนมาก พบทั่วไปในที่ค่อนข้างโล่งชายป่าดิบหรือป่ารุ่มชื้น ที่ต่ำทั่วไปในภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤๅณ ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559, 792 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

