

ตะเคียนเต็ง

Shorea thorelii Pierre วงศ์ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง : เต็งตานี ชัน ชันตัก ตานี ยางแกน ยางหมอก ยางหยวก ยางหิ้ง สะแบง

ตะเคียนเต็ง เป็นไม้ต้น สูงถึง 30 ม. ไม้ผลัดใบหรือผลัดใบ แต่ผลัดใบใหม่ได้ในระยะสั้น กิ่งอ่อน ใบอ่อน และช่อดอกมีขน นุ่ม ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักมีพูพอนต่ำ เปลือกสีน้ำตาลอมแดง แตกเป็นสะเก็ดห้อยย้อยลง เปลือกในสีเหลืองอ่อน กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ใบเป็นรูปไข่และรีและมีขนนุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน และบางที่เป็นรูปขอบขนานแคบ กว้าง 4-5 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ผิวใบเกลี้ยง ด้านบนสีน้ำตาลแดงเมื่อแห้ง เส้นแขนงใบ 12-15 คู่ ก้านใบยาว 1.5-2 ซม. ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ผล รูปไข่ ปลายแหลม กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 1-1.4 ซม. มีขนนุ่ม มีปีกใหญ่และยาว 3 ปีก ปีกเล็กและสั้น 2 ปีก

ตะเคียนเต็งมีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าดิบแล้ง ใกล้แหล่งน้ำที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 350-850 ม. ในต่างประเทศพบที่พม่า ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ออกดอกเป็นผลเดือนมกราคม-พฤษภาคม



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/Pattani_botany

ภาพประกอบ : ภาพบน : http://www.dnp.go.th/Pattani_botany

ภาพล่างซ้าย-ขวา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

