

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 10-30 เมตร บางทีมีพูพอน เปลือกสีน้ำตาลอมเทา เลือกลงในสีออกชมพู มีกลิ่นเครื่องเทศแรง ใบ กว้าง 2.5 ถึง 7 ซม. ยาว 6-16 ซม. รูปรีหรือรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายทู่หรือแหลม โคนรูปลิ้ม มักเบี้ยว เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวเข้มด้านบน มีนวลด้านล่าง เกือบทั้งสองด้านหรือมีขนกระจายบนเส้นใบเฉพาะด้านล่าง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบนเส้นใบ 4-8 คู่ เป็นร่องตื้นด้านบนบนทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดชิดกัน งามทั้ง 2 ด้าน ก้านใบยาว 1.2 ถึง 3 ซม. เล็กเรียว เกือบทั้ง ดอกออกเป็น ช่อกระจุก ยาว 1-2 ซม. ก้านช่อดอกรวมสั้นมาก ยาวน้อยกว่า 3 มม. ส่วนมากออกตามกิ่งไต่รอยแผลใบ แต่ละช่อช่รมมีก้านยาว 0.6 ถึง 1.2 ซม. มี 5-6 ดอกต่อ 1 ช่อช่รม ก้านดอกยาว 1.5 ถึง 3 มม. มีขนแน่น ผลยาว 0.8 ถึง 1 ซม. ก้านผลยาว 5-7 มม. ก่อนข้างกลมสีเขียวมีจุดขาว แก่สีชมพูเข้มถึงม่วง แล้วเป็นสีดำมัน อยู่บนกลีบรวมรูปจานรองถ้วยตื้นเส้นรอบวงยาวมากกว่า 5 มม. พบในป่าทั่วไปสูงได้ถึง 600 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=5625>

