


ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร เมตร เปลือกสีเทาหรือน้ำตาลอมเทา เรียบหรือเป็นเกล็ดเล็กน้อย กิ่งอ่อนมีขนละเอียด ใบ กว้าง 3.7 ซม. ยาว 9-18 ซม. ออกสลับถึงกิ่งตรงข้าม ค่อนข้างออกดก ใกล้เคียงถึง รูปรีแคบถึงขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ปลายทู่หรือแหลมสั้น โคนแคบ ค่อนข้างเบี้ยว เนื้อคล้ายหนัง เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 5-7 คู่ เป็นมุมแหลมชัน เชื่อมกันใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อย ทำมุมฉากกับเส้นกลางไป งามถึงค่อนข้างเห็นชัดทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-2 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแตกแขนง ยาว 8-19 ซม. ตามซอกใบและเป็นกลุ่มใกล้เคียง มีขนสีน้ำตาล แต่ละดอกมีก้านดอกยาว 3-5 มม. มีขนละเอียดสีน้ำตาล กลีบรวมและก้านชูอับเรณูมีขน ผล กว้าง 1-1.7 ซม. ยาว 3-5 ซม. รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ แก่สีแดงเข้มถึงดำ มีก้านผลชัดสีชมพู ปลายบวม พบตามป่าค่อนข้างสมบูรณ์ สูงได้ถึง 1200 เมตร ในคาบสมุทรมมาเลเซีย จังหวัดพังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์, ฟินดา สิทิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาควิ2 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : ภาพช่อดอก : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=4489>
ภาพหลังใบ/ผลอ่อน/ผลแก่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี