



ปาล์ม ลำต้นขนาดใหญ่ มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สูง 20 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 40-60 ซม. มีรอยกาบใบเป็นวง และคลุมด้วยเส้นใยของกาบใบแห้งจนถึงพื้น มีรากค้ำจำนวนมากที่โคนต้นสูงจากพื้น 80 ซม. เมื่อดันติดผลแล้วจะตาย ใบ ประกอบแบบขนนก ตั้งแต่ 12-15 ทาง กาบใบแยกออกจากกัน ขอบกาบใบเป็นเส้นแห้งแข็งสานกันเป็นร่างแห สีดำ บางครั้งเปลี่ยนเป็นเส้นแข็งตั้งขึ้นคล้ายหนาม ยาว 60-100 ซม. ก้านใบอ่อน ยาว 1 เมตร แผ่นยาว 6-7 ม. มีใบย่อยได้ถึงด้านละ 150 ใบ ใบขนาด 7-10×100-130 ซม. เรียงตัวสม่ำเสมอในระนาบเดียวกันพบน้อยมากที่จะเรียงบิดต่างระนาบกัน ใต้ใบสีเทาอมน้ำตาล ปลายหยักไม่สม่ำเสมอ แต่ปลายใบคู่สุดท้ายมักติดกันและกว้างกว่าคู่อื่น ดอก ช่อดอกออกระหว่างกาบใบ 4-6 ช่อ ช่อดอกรวมยาว 2-2.5 ม. โดยจะเริ่มออกทางด้านปลายยอดไล่ลงมาตามลำต้น ก้านช่อดอกอ่อน ยาว 60-90 ซม. ช่อดอกยาว 1.2-1.6 ม. แดกกิ่งย่อยห้อยลง 40-50 กิ่ง ยาว 1.6 ม. ผล ทรงกลม ขนาด 5-7 ซม. พบตามริมเขาหินปูนในป่าขึ้นทั่วทุกภาค ที่ความสูง 500 ม.ภาคใต้พบบ่อยมากตามเขาหินปูนหรือซอกเขา ขึ้นโดยจะพบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่บริเวณเชิงหน้าผา กระจายพันธุ์ในเขตชายแดนไทย - มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ภูฏาน และอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลอ้างอิง : พจนานุกรมพืชพรรณศาสตร์. ปาล์มและปรงในป่าไทย-กรุงเทพฯ: บ้านและสวน, 2548. 271หน้า

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Arenga+westerhoutii>

