

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 24 ม. ลำต้นเป็นร่อง มีพูพอนชั้นแคบ สูงได้ถึง 1 ม. เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลอ่อน หรือสีส้ม แตกเป็นร่องละเอียด เป็นแผ่นลอกเป็นแถบ ชั้นกลางสีแดงเข้มถึงน้ำตาลแดง เปลือกในสีเหลืองอ่อนถึงสีส้ม มีกลิ่นแรงคล้ายหัวหอม ใบ ยาว 60(120) ซม. ออกสลับ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ หรือดูลายใบประกอบแบบขนนกปลายเดี่ยว ใบย่อย 3-6(8) คู่ ออกตรงข้าม กว้าง 2.5-8 ซม. ยาว 8-25 ซม. รูปขอบขนานแกมรีหรือรูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนเบี้ยวชัด ค่อนข้างโค้ง ใบแก่เนื้อ คล้ายหนังบาง ด้านบนสีเขียวเป็นมัน เกือบทั้งสองด้าน เมื่อขยี้ใบมักมีกลิ่นคล้ายหัวหอม เส้นใบ 8-12(14) คู่ มีเส้นสันแซม โค้งชัน ฐานเล็กน้อยด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นร่างแห ก้านใบย่อยยาว 0.5-2 ซม. แกนกลางใบ ปลายสุดคล้ายตอ(หรือรอยแผลเป็น) กิ่งมีตายอดคล้ายกำป็น ดอก สีขาวหรืออมชมพู กลิ่นหอม ออกเป็นช่อกระจุก แตกแขนงมาก ยาว 10-25(40) ซม. แกนกลางช่อมีขนละเอียด ก้านดอกยาว 2-4 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1.5-2.5 มม. รูปถ้วยหรือทรงกระบอกสั้น จักชีฟันไม่เท่ากัน 4 ซี่ เกือบหรือมีขนละเอียดด้านนอก กลีบดอก 4-5 กลีบ ยาว 5-8 มม. รูปแถบแคบไม่ซ้อนกัน เกือบหรือมีขนด้านใน หลอดเกสรเพศผู้ไม่จักหรือเป็นซี่ฟันเล็ก 8(10) ซี่ เกือบหรือมีขนด้านนอก ค่อนข้างมีขนด้านใน อับเรณู 8(10) อัน ยาวประมาณ 1 มม. โพล์พ้นปากหลอด จานฐานดอกขนาดประมาณ 1 มม. ขอบแบนหรือเป็นพูเล็กน้อย มีขนทั้งสองด้าน รังไข่มี 3 ช่อง เกือบหรือมีขน ยอดเกสรเพศเมียคล้ายจาน ผล ยาวได้ถึง 5(7.5) ซม. เป็นช่อ ค่อนข้างแตกแขนง ยาวได้ถึง 25 ซม. ค่อนข้างกลม ปลายมีจะงอย บางที่จักเป็นพูและเป็นข้อระหว่างเมล็ด เมื่ออ่อนสีเขียวอ่อน สุกสีแดงสด แก่แตกออก 3 ส่วน เมล็ด 1-4 เมล็ด มีเยื่อสีขาวเล็กน้อยที่โคน ให้น้ำขาว มีกลิ่นคล้ายหัวหอมเมื่อผ่า

พบในป่าดิบเดิมที่ต่ำ สูงได้ถึง 300 ม. ป่าดิบเขาสูงได้ถึง 1,800 ม. ในคาบสมุทรมลายู เอเชีย จ.สุราษฎร์ธานี ตรัง

