

Vitex pinnata L.

วงศ์ LAMIACEAE

ตีนนก(นน)

ชื่อพื้นเมือง : กะพุน, กานน, กานามปีก, ไก่เน่า, โคนสมอ, ตะพรุน, ตะพุน, ตะพุนทอง, ตะพุ่มตีนนก, นน



ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. มีข้อประป่ายตามกิ่งอ่อน แผ่นใบ ซ่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ในประกอบมี 3-5 ใบอยู่ ก้านใบยาว 3-10 ซม. ก้านใบอ่อนมีปีก ใบอยู่รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกรมรูปไข่กลับ ยาว 8-15 ซม. ปลายแหลมยาว ก้านใบอยู่สั้นซ่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 20 ซม. ก้านซ่อยาว 2-7 ซม. ดอกหนาแน่น ไว้ก้านหรือมีก้านสั้นมาก หลอดกลีบเลี้ยงยาว 4-6 มม. ปลายจักตื้น ๆ ดอกสีม่วงอ่อน หลอดกลีบดอกยาว 2-3 มม. กลีบปากบนแยกกลม ขนาด 1-1.5 มม. กลีบปากล่างยาว 3-3.5 มม. ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1.5 ซม. อันสั้นยาวประมาณ 1 ซม. โคนก้านมีขัน ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.5 ซม. สุกสีดำ พบริอินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย พลีบินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร เปเลือกและใบมีสรรพคุณต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้ไข้ แก้ปวดห้อง



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81&typeword=group>

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81&typeword=group>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

