

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้นขนาดใหญ่ โคนมีพูพอนขนาดใหญ่ กิ่งห้อยลง เปลือก สีน้ำตาลอมเทา มีแต่มีสีอมเหลือง แตกเป็นแผ่นไม่เป็นระเบียบและเป็นเกล็ด เปลือกในสีชมพู ใบ รูปใบหอกแกมขอบขนานกว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 6-14 ซม. ปลายเรียวแหลมสั้น โคนรูปลิ้มกว้าง เนื้อใบคล้ายหนังบาง ใบแห้งสีน้ำตาลแดง เกลี้ยงหรือมีขนบนเส้นกลางใบด้านบน ด้านล่างมีขนหรือเกลี้ยง มีตุ่มใบขนตามซอกเส้นใบ เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบเล็ก 12-22 คู่ โค้งใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดแน่น จาง ก้านใบเรียวยาว 1.2-1.8 ซม. มีขนหูใบรูป ขอบขนานกว้างถึง 5 มม. ยาวถึง 7 มม. ร่วงง่าย ดอก สีเหลืองสด มีแต่มีสีแดงที่ โคนด้านใน เป็นช่อเรียวยาวถึง 10 ซม. ตามง่ามใบที่ปลายยอด อดอกรูปรีแคบ ยาวถึง 1 ซม. กลีบเลี้ยงมีรูปไข่ปลายแหลม กลีบดอกรูปใบหอก แคบมีขนแน่น ร่วงแยกกัน เกสรเพศผู้ 20-40 อัน อับเรณูรูปขอบขนาน ปลายมีรยางค์คล้ายหนามยาวประมาณ 1/2-1 เท่าของอับเรณู รังไข่รูปกรวยมีขนแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาว 1/2 ของรังไข่ เกลี้ยง ผล ปีกยาว 3 ปีก กว้าง 0.6-1 ซม. ยาว 4-5.5 ซม. คล้ายขน ขนละเอียด อีก 2 ปีก สั้นรูปขอบขนานแคบ กว้าง 0.3 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. รูปไข่กว้าง 0.7 ซม. ยาว 1 ซม. ปลายมีจะงอยสั้น มีขน โคนปีกหุ้มผล พบในป่าดิบที่ต่ำและป่าดิบมีไม้ผลัดใบบนเขาหินปูน

ข้อมูลอ้างอิง : ไขมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองงานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

