

น่องขาว(ตีนเป็ดเล็ก)

APOCYNACEAE

ไม้ต้น สูงถึง 30 เมตร เปลือกสีส้มหรือน้ำตาลอ่อน เปลือกในสีขาว มียางขาวมาก ในรูปของขานหรือรูปรี กว้าง 1.6 ถึง 5.5 ซม. ยาว 5-14 ซม. ติดเป็นวงรอบข้อ 3 ถึง 4 ใน เรียวแหลมไปทางปลาย โคนแหลม เกลี้ยง เส้นใบ 35-55 คู่ อยู่ชิดขนาดกัน ก้านใบยาว 1-2 .3 ซม. มีปีกเล็กแคบ ดอกสีขาวออกเป็นกลุ่มมีหลายดอก ช่อดอกยาว 2 ถึง 4.2 ซม. ก้านดอกยื่นอย่างยาว 1-2 มม. ไม่มีขนคลุมเลี้ยงยาว 1.5 ถึง 2 มม. สีแดงน้ำๆ รูปไข่ปลายตัดหรือกลม มีขนเฉพาะที่ขอบ กลีบดอกมีหลอดกลีบยาว 4-6 มม. กล้ายเป็นกลีบรูปของขานปลายกลม ยาว 2.5 มม. เรียงห้อนไปทางซ้ายในตากดอ คงจะเอียดด้านในเกรตตัวผู้ติดเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบดอกเล็กน้อย อับเรณูยาว 1 มม. สีเหลืองทอง รังไข่กลีบไม่มีฐานฐานดอก ก้านเกรตเพศเมียยาวมากกว่า 3 มม. ผล กว้าง 0.8 ซม. ยาว 12 ถึง 20 ซม. ออกเดี่ยว กลีบ ผนังผลหนาเมล็ดกว้าง 2.5 มม. ยาว 10 มม. ปลายกลมทั้งสองด้าน พับในปีดิบ ป่ารุ่น สูง 1,300 เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน ก้าวเด่นชัย พินดา ลิทธิอุนทร ก่อภักดิชา ขยายมฤต, นักป่าภาคใต้ – นิตยสารที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คิมพ์ปี 2558. 768 หน้า
ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก : http://www.biotik.org/laos/species/a/alsro/alsro_05_lo.html.



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

