

ชื่อพื้นเมือง : ตัวขาว ตัวส้ม แด้วหอม มูโตะ

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ผลัดใบ อาจสูงได้ถึง 20 ม. ต้นอ่อนมีหนาม เปลือกแตกเป็นสะเก็ดหนา สีน้ำตาลดำ กิ่งเกลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-10 ซม. แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 2-7 มม. ปลายมนหรือแหลม โคนรูปปลีกว้าง ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ช่อดอกมี 1-8 ดอก ออกสั้น ๆ ตามซอกใบที่หลุดร่วง ก้านดอกยาว 0.3-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาว 5-7 มม. ปลายมน มีต่อมเป็นริ้วกระจาย ดอกสีขาวอมชมพู กลีบรูปไข่กลับ ยาว 1-1.5 ซม. มีก้านสั้น ๆ ปลายกลีบมีต่อมกระจาย ขอบมีขนครุย ปลายกลีบ มีเกล็ดขนาดเล็ก มัดเกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 ซม. ระหว่างมัดมีเกล็ดรูปรีขนาดเล็ก ก้านชูอับเรณูยาวเท่า ๆ มัดเกสรเพศผู้ แกนอับเรณูไม่มีต่อม รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-8 มม. ผลรูปขอบขนาน ยาว 0.6-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงหุ้มประมาณกึ่งหนึ่ง เมล็ดยาว 6-7 มม. รวมปีก พบที่จีนตอนใต้ ไต้หวัน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร แยกเป็น ตัวขน subsp. *pruniflorum* (Kurz) Goelele มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบทั้งสองด้าน ก้านใบ ก้านดอก และกลีบเลี้ยง กลีบดอกมีต่อมโปร่งแสง แกนอับเรณูมีต่อม เปลือกแก่ท้องร่วงในสัปดาห์เดียว ใบอ่อนขงแทนใบชาคลายตัวเกลี้ยง



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Cratoxylum0formosum0\(Jacq\)0Benth.010Hook.0f.0ex0Dyer](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Cratoxylum0formosum0(Jacq)0Benth.010Hook.0f.0ex0Dyer)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Cratoxylum0formosum0\(Jacq\)0Benth.010Hook.0f.0ex0Dyer](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Cratoxylum0formosum0(Jacq)0Benth.010Hook.0f.0ex0Dyer)