

ชื่ออื่น : กุ่มด่องบ้าง ชีตัว ตัวเกลี้ยง ตัวใบเลื่อม

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม. ลำต้นและกิ่งเรียบ เกลี้ยง มักมีหนาม ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-12 ซม. แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 2-5 มม. ปลายมน แหลม หรือแหลมยาว โคนรูปลิ้น ช่อดอกมี 1-5 ดอก ออกสั้น ๆ ตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 1-3 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 5-7 มม. ปลายมน มีต่อมเป็นริ้วกระจาย ดอกสีชมพูอมแดงหรือส้ม กลีบรูปไข่กลับ ยาว 0.5-1 ซม. มีต่อมกระจาย ปลายกลม ไม่มีเกล็ด มัดเกสรเพศผู้ยาว 4-8 มม. ระหว่างมัดมีเกล็ดหนารูปเส้นสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ 3 มม. ก้านชูอับเรณูสั้น รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มม. ผลรูปรี ยาว 0.8-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงหุ้มเกิน กิ่งหนึ่ง เมล็ดยาว 6-8 มม. รวมปีก

พบที่จันทอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นในป่าผลัดใบและไม้ผลัดใบ ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร ผลอ่อนเป็นเครื่องเทศใช้ปรุงอาหาร รากและกิ่งมีสรรพคุณแก้ไอ ท้องเสีย ใบอ่อนใช้ชงแทนใบชา



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Cratoxylum0cochinchinense0\(Lour.\)0Blume](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Cratoxylum0cochinchinense0(Lour.)0Blume)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Cratoxylum0cochinchinense0\(Lour.\)0Blume](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Cratoxylum0cochinchinense0(Lour.)0Blume)