

เต่าร้างแดง

Caryota mitis Lour.

วงศ์ ARECACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กะกั โกกั แคน จะเคียน จีองา จูเค้ โซเก ตะเคียน ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ่ ไพร

ปาล์มแตกกอ สูงได้ถึง 10 ม. ลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลางโตได้ถึง 20 ซม. ก้านใบยาว 0.8-2 ม. แขนกลาง ใบประกอบยาว 2-2.8 ม. ใบประกอบย่อยข้างละ 10-23 ใบ ใบประกอบย่อยชั้นที่สองข้างละ 10-20 ใบ ใบย่อยรูปสามเหลี่ยมเรียวแหลมปลายจัก ยาว 20-30 ซม. บางครั้งแฉกลึกจรดโคน 2-3 แฉก คล้ายหางปลา ช่อดอกโค้งลง ยาวได้ถึง 85 ซม. แขนช่อยาว 20-65 ซม. ช่อย่อยจำนวนมาก ดอกเพศผู้กลีบดอกยาว 1.2-1.5 ซม. ดอกเพศเมียกลีบดอกยาว 4-5 มม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. สุกสีม่วงดำ ส่วนมากมีเมล็ดเดี่ยว เนื้อในเมล็ดเป็นชั้น พบที่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิlippินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น หรือป่าเสื่อมโทรม และเป็นไม้ประดับ เปลือกผลทำให้ระคายเคืองเส้นใยกาบประคบแผลสดห้ามเลือด



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Caryota0mitis0Lour.>
ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2607>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

