

ไทร (ไทรกิ่งเทา)

Ficus annulata Blume

วงศ์ MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 24 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มแน่น ลำต้นสั้น มักเปื้อนครีตไม้อื่น แต่พบน้อยที่ทำให้ต้นที่ถูกเปื้อนตายไป บางทีขึ้นได้โดยไม่อาศัยไม้อื่น เปลือก สีครีม เรียบหรือหยาบเล็กน้อย เปลือกในสีเหลืองสดถึงสีน้ำตาลอมเหลืองขุ่น มีเส้นใยค่อนข้างแข็งแรง ใบ กว้าง 6-12 ซม. ยาว 18-30 ซม. ออกสลับ เวียนรอบกิ่ง รูปขอบขนานหรือไข่กลับแคบ ปลายเรียวแหลมสั้น โคนรูปลิ้มหรือกึ่งรูปหัวใจ ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง เกลี้ยงหรือมีขนอ่อนกระจายบนเส้นใบทั้งสองด้าน เส้นกลางใบแบนหรือนูนเล็กน้อยด้านบน เส้นใบจากโคนแยกไม่ชัดจากเส้นใบข้าง ยาว 1/20-1/10 ของใบ ไม่แตกแขนง เส้นใบข้าง 12-18 คู่ ค่อนข้างขนานกัน เป็นวงที่ขอบใบ เป็นร่องด้านบน บางแต่นูนชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นร่างแหหรือขั้นบันไดจาง ค่อนข้างขนานด้านบน ก้านใบยาว 1.8-3.5 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนอ่อน หูใบยาว 1.5-3 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนละเอียด ร่วงเร็ว กิ่งลำ มีแผลใบชัด ผล ขนาด 2-3 ซม. ออกเป็นคู่หรือพบน้อยออกเดี่ยว ที่ง่ามใบ ทรงรีถึงรูปไข่หรือค่อนข้างกลม ปลายมียอดคล้ายหัวนม และมีช่องเปิดนูนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. สีเขียวขุ่น มีจุดสีครีม สุกสีเหลืองถึงส้ม หรือออกชมพู เกลี้ยงหรือมีขนละเอียดใกล้ช่องเปิด ก้านผลยาว 0.5 ถึง 1.8 ซม.ใหญ่ลำ ที่ปลายคล้ายวงแหวน บวมโคนมีใบประดับ 3 ใบ กิ่งไม่เท่ากัน ยาว 3-10 มม. ติดที่ด้านในวงแหวนเห็นชัดในผลอ่อนแต่เมื่อแก่จะร่วงไป พบบ่อยในป่าดิบที่ต่ำและป่าดิบเขา

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพผล/ลำต้น <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/4300134911/in/photostream/>

ภาพใบ : <https://borneoficus.info/2018/01/19/ficus-bracteata-batang-duri-zoo-temburong-brunei/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

