

ชื่ออื่น :

ไม้ต้นเล็กถึงกลาง สูง 6-20 ม. บางทีมีพูพอน เปลือก น้ำตาลอมเทาถึงออกชมพู เรียบถึงลอกเป็นแผ่นหรือเป็นเกล็ด เปลือกในสีเหลืองถึงน้ำตาล กลิ่นหอม ใบ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 8-20 ซม. รูปขอบขนานแกมรีถึงไข่กลับแคบ ปลายทู่หรือเรียวแหลมโคนรูปลิ้น เนื้อคล้ายหนัง เกลี้ยงทั้งสองด้าน มีนวลด้านล่าง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 7-12 คู่ งามหรือเป็นร่องเล็กน้อยด้านบน เห็นไม่ชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยคล้ายร่างแหละเอียด งามทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-3 ซม. เป็นร่องด้านบน เกลี้ยง ดอก ออกเป็นช่อคล้ายช่อกระจะ ยาว 1-2.8 ซม. ตามซอกใบหรือใต้รอยแผลใบ แต่ละช่อซี่ร่มยาว 0.5-1 ซม. มี 5-7 ดอกต่อ 1 ช่อซี่ร่ม แต่ละดอกมีก้านดอกยาว 1.5-2 มม. เกลี้ยง ผล ยาว 1-1.3 ซม. ก้านผลใหญ่ล่ำ ยาว 2 ซม. ค่อนข้างกลม เกลี้ยง หุ้มด้วยถ้วยกลีบรวมเล็ก หรือรูปกระบองบางส่วน เกลี้ยง เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 1-1.2 มม. พบในป่าดิบที่ต่ำ สูงได้ถึง 100 ม. จ.พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

