

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น

ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 16 เมตร ขึ้นเบียดรัดไม้อื่น เปลือก สีเทาอ่อน เรียบ ใบ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-16 ซม. ออกเรียงเวียน รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่กลับ ปลายกลมถึงตัดหรือเป็นแฉ่งเล็กน้อย โคนแคบหรือพบน้อยโคนกลม ขอบคลื่นข้างม้วนและมีปุ่มหนามไปยังปลาย ใบแก่เนื้อคล้ายหนังหนา สีเขียวเข้มช่นคุณดำนบน สีเขียวอมเทาเมื่อเส้นใบสีเข้มด้านล่าง เกือบทั้งสองด้าน เส้นกลางใบกว้างและแบน หรือมนเล็กน้อย ด้านบน เส้นใบจากโคน 1-2 เส้น เส้นใหญ่สุดยาว $1/6-1/3$ ของใบ ไม่แตกแขนง เส้นใบข้างเล็ก เรียว 8-12 คู่ เป็นวงและเชื่อมกันใกล้ขอบใบเป็นเส้นขอบใบ เส้นใบย่อยจำนวนมาก ส่วนมากขนานกับเส้นใบข้าง ก้านใบยาว 1-2 ซม. อ้วนลำ เกือบกลม หนุมใบยาว 1-2 ซม. เกือบกลมหรือมีขนอ่อนสั้นสีขาว ร่วงเร็ว กิ่งอ้วนลำ เกือบกลมหรือมีขนอ่อนสั้นสีขาว ผล ขนาด 1-1.5 ซม. ไม่มีก้านผล ออกเป็นคู่หรือพบน้อยที่ออกเดี่ยว ตามง่ามใบและใต้รอยแผลใบ ทรงกลมหรือแบนเล็กน้อย(กว้างมากกว่าสูง) ปลายค่อนข้างมน ช่องปากมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. เกือบกลมหรือมีขนเล็ก ๆ สีน้ำตาลใกล้ปาก สีเหลืองช่น แก่สีส้มออกชมพู (ถึงแดงหรือม่วง) มีใบประดับที่โคน 3 ใบ ขนาด 2-6 มม. ปลายกลม ขนาดค่อนข้างเท่ากัน ติดทน พบกระจายทั่วไปในป่าดิบ และป่ากึ่งผลัดใบ สูงได้ถึง 700 เมตร มักพบบริเวณหินบนเขาหินปูนหรือตามชายฝั่งทะเล



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : สมรพันธ์พรินตติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/ficus-curtipes.html>

