

Ficus tinctoria G.Forst.

วงศ์ MORACEAE

ไทรกร่าง(ไทรกร่างน้ำ)

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้พุ่ม

อิงอาศัย หรือไม้ต้นเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร กิ่งก้อยและมีรากอากาศเล็กเรียวยาวจำนวนมาก ใบ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-12 ซม. ออกสลับ ในระนาบเดียวบนกิ่ง รูปร่างไม่แน่นอน รูปขอบขนานแกมรีหรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเบี้ยว โคนแหลมทั้งสองด้าน มักเบี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบ ใบแก่แข็ง เกลี้ยงและมักเป็นมันด้านบน เกลี้ยงหรือหยาบละเอียดด้านล่าง และอาจมีหนามกระจายบนเส้นใบด้านล่าง เส้นกลางใบแบนหรือนูนเล็กน้อยด้านบน เส้นใบจากโคนยาว $1/8-1/3$ ของใบ เกือบถึงขอบใบ ไม่แตกแขนง เส้นใบข้าง 5-9 คู่ แตงห่างจากขอบใบ เส้นใบย่อยคล้ายร่างแหถึงกึ่งขึ้นบันได ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.3-1.5 ซม. มีขนแหลมเล็กๆประปราย มีสะเก็ด ใบยาว 0.5-1 ซม. มีรอยแผลเป็นวงรอบกิ่ง กิ่งต้น มีขนหนามหรือขนอ่อนประปรายเมื่ออ่อน ผล ขนาด 0.8-1.5 ซม. ไม่มีก้านผลหรือก้านสั้น ยาวได้ถึง 6 มม. ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ที่ง่ามใบ หรือใต้ตาใบและตามกิ่งแก่ ทรงกลมถึงรูปลูกแพร์ มีขอบตื้นรอบช่องเปิดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มม. สีเขียวสดสุกสีส้มถึงแดง มีขนหนามสั้นๆหรือค่อนข้างเกลี้ยง ไม่มีเกล็ดข้าง มีใบประดับเล็ก 3 ใบ ยาวประมาณ 1.5 มม. ติดเป็นวงที่โคนก้าน พบในป่าดิบและป่าผลัดใบ-ป่าไผ่ สูงได้ถึง 800 เมตร มักพบใกล้ลำน้ำหรือบนหินใกล้ชายฝั่ง

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

