

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้พุ่มหรือไม้เลื้อย อิงอาศัย สูงได้ถึง 12 เมตร บางทีเจริญขึ้นเบียดรัดไม้อื่น เปลือก สีครีมหรือน้ำตาลอ่อน 5-9 ซม. ยาว 10-23 ซม. ออกสลับ เรียงเวียน รูปรีถึงขอบขนานแคบ ปลายเรียวแหลม โคนทู่ถึงกลมหรือกึ่งรูปหัวใจ ใบแก่เนื้อคล้ายหนังสีเขียวเข้มด้านบน ด้านล่างสีเขียวมีเส้นใบสีเหลืองอ่อน เกือบทั้งสองด้าน เส้นกลางใบแบนถึงเป็นแอ่งตื้นด้านบน เส้นใบจากโคนเป็นมุมแหลมยาว $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{5}$ ของใบ เส้นใบข้าง 6-14 คู่ เห็นชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยคล้ายร่างแห ก้านใบยาว 2-5 ซม. สีเหลืองอ่อน เกือบ หูใบยาว 1-5 ซม. ติดทนรอบตายอดรูปโคนแคบ หุ้มค่อนข้างอ้วนลำ สีนํ้าตาลอมส้มสีนํ้าตาลเข้ม มีขุยสีนํ้าตาลเมื่ออ่อน ผล 1-1.5 ซม. ส่วนมากออกเป็นคู่ ตามง่ามใบหรือใต้รอยแผลใบ รูปรีถึงกลม ปลายแบนหรือบวมเล็กน้อย มีขอบตื้นรอบช่องปาก สีเขียวอ่อนมีจุดขาว มีขนสีนํ้าตาลเป็นขุยโดยเฉพาะเมื่อยังอ่อน สุกสีเหลืองถึงนํ้าตาลแดง ล้อมรอบด้วยเกสรเป็นหมวกในตา ก้านผลยาว 0.2-0.7 ซม. บวมเล็กน้อยตอนปลาย มีใบประดับติดทน 3 ใบ ขนาด 0.5-2 มม. มีขุยสีนํ้าตาลเข้ม พบมากในป่าดิบที่ต่ำหรือป่าผลัดใบ ทั้งป่าเดิมและป่ารุ่นในภาคใต้

ข้อมูลอ้างอิง : การค้นคว้า, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=4182>