


ไม้ต้นสูงถึง 20 ม. เรือนยอดแน่น โคนต้นเป็นร่องเล็กหรือเป็นพูพอนแคบ เปลือกสีน้ำตาลอ่อน ถึงน้ำตาลอมแดง เรียบและเริ่มแตกเป็นแผ่น หรือเป็นเกล็ดตามแนวตั้ง เปลือกในสีส้มอมเหลืองอ่อน ใบ ออกเวียนสลับ รูปรีถึงขอบขนาน กว้าง 2-9 ซม. ยาว 6-25 ซม. ปลายหู่หรือแหลมสั้น โคนกลมหรือ รูปลิ้น ขอบเรียบเกลี้ยงและเป็นมันทั้งสองด้าน เส้นกลางใบนูน หรือแบนด้านบน เส้นใบ 11 – 20 คู่ เห็นชัด นูนด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันไดชิดกันมากและขนานกัน จางด้านบน ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 3- 7 ซม. เล็กเรียว ปลายบวมทั้งสองด้าน กิ่งค่อนข้างเล็กเรียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 มม. ตรงใกล้ปลาย) เรียบ หรือเกือบเรียบสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดง มีรอบแผลเป็นของหูใบตามแนวราบชัด ตาใบรูปโคนแคบ หุ้มด้วยหูใบรูปใบหอก ยาว 2-2.5 ซม. ดอก ขนาดประมาณ 5 มม. สีครีมถึงสีขาวออกเขียวอ่อนหรือเหลืองสมบูรณ์เพศ สมมาตร ออกเป็นช่อแตกแขนงเล็กเรียว ยาว 10 -25 ซม. ตามซอกใบบนๆหรือกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 2-3 มม. เล็กเรียว มีข้อต่อ กลีบเลี้ยงมีพู่ 5 พู่ ยาวประมาณ 1 มม. มีขนละเอียดด้านใน ปิดในตาดอก เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาวประมาณ 2 มม. ก้านชูอับเรณู เล็กเรียว ติดอยู่ระหว่างพูของจานฐานดอกนุ่มสีเหลือง 5 พู่ อับเรณูรูปสามเหลี่ยม รังไข่ยาวประมาณ 1.5 มม. มี 2 ช่อง แยกจากฐานดอกรูปรี มีกระจุกคล้ายไหม ที่ปลายเกสรเพศเมีย 2 อัน ค่อนข้างยาวถึง ½ ของรังไข่ ผล ยาว 1-2 ซม. สีเขียว สุกสีแดงสด แยก 2 พู (พูหนึ่งเล็กกว่าเล็กน้อย) แต่ละพู รูปไข่กลับ โคนหู่หรือแหลม แก่แตก มี 2-4 เมล็ด กว้าง 7 มม. ยาวประมาณ 10 ซม. มีเนื้อบางสีชมพู หุ้มที่โคนขึ้นมา มากกว่า 2/3 ของเมล็ดผนังผลชั้นในแข็ง ใหญ่ พบน้อยในป่าดิบที่ต่ำและป่าพรุ มักพบใกล้น้ำ จ.ภูเก็ต ตรัง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก้องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 1. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คปไฟ ;2559

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3306>