

# *Calophyllum symingtonianum* M.R.Hend. & Wyatt-Smith.

ตั้งหน

CALOPHYLLACEAE

ชื่อพื้นเมือง

ไม้ต้นใหญ่ สูงถึง 25 ม. ลำต้นกลม เส้นรอบวงยาวถึง 90 ซม. ไม่มีพูพอน เปลือก สีเทาอมครีมถึงสีน้ำตาลอมเหลือง แตกเป็นร่องหยาบ เปลือกในสีชมพู มีน้ำเลี้ยงเหนียวสีคล้ายน้ำผึ้งกระจายทั่วไป ใบ ค่อนข้างเล็ก รูปรีแคบถึงใบหอกแกมรี กว้าง 2-3 ซม. ยาว 6-9 ซม. (ยาว 3-3.5 เท่าของกว้าง) ปลายเรียวแหลม โคนสอบรูปลิ้นหรือแคบ เนื้อใบคล้ายหนังบาง เส้นกลางใบนูนด้านบน มีร่องตื้นที่ครึ่งด้านล่าง เส้นใบชัดหรือจาง ก้านใบเล็กยาว 1-1.5 ซม. เกือบหรือมีขน กิ่งไม่มีขนหรือเป็นมุม กลี้ยง ตาที่ปลายยอดรูปกรวยแคบ ยาวประมาณ 0.5 ซม. มีขนสีน้ำตาลละเอียด ดอก เป็นช่อกระจุกไม่แตกแขนง ยาว 4.5-6 ซม. ที่ปลายกิ่งและตามซอกใบบนๆ มีขนสีน้ำตาล มี 7-11 ดอก ก้านดอกยาว 0.6-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ยาว 4-6 มม. ด้านนอกมีขนสีน้ำตาลกระจายไปยังโคน กลีบคู่นอกรูปไข่หรือกลม กลีบคู่ในรูปไข่กลับและใหญ่กว่าเล็กน้อย คล้ายกลีบดอก กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 6 มม. เกสรเพศผู้ 50-70 อัน ยาวถึง 4 มม. ผล รูปไข่กลับ กว้าง 1.7-2.5 ซม. ยาว 2-3 ซม. ปลายทู่หรือกลม ปลายแหลมเป็นก้านเกสรเพศเมีย เปลือก หนา แท่งสีน้ำตาลอมแดงเข้มถึงออกม่วง พบน้อยในป่าดิบสมบูรณ์ สูง 100-350 ม. จ. ตรัง สตูล สงขลา ยะลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคได้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

