

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 25 เมตร ลำต้นตรง มีพูพอนเล็กหรือเตี้ยแหลม เปลือก สีน้ำตาลเทาถึงดำ เป็นร่องตื้น เมื่อตัดมีน้ำเลี้ยงสีน้ำผึ้งใส ใบ รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่กลับ กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนรูปกลมหรือสอบแคบ ขอบไม่เป็นคลื่น เนื้อบางหรือหนา เส้นกลางใบ เป็นสันคมด้านบน ครึ่งล่างหรือ 2/3 ของใบมีร่องตรงกลาง เส้นใบชัด ก้านใบยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร เกือบ กิ่งอ่อนเล็ก มี 4 มุมหรือแบน เกือบ ยกเว้นตาใบ ดอก ช่อยาว 1.5-5 เซนติเมตร มี 3-11 ดอก มีขนกระจาย ก้านดอกยาว 0.5-2.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง/กลีบดอก (4)5-8 กลีบ เกือบด้านนอก กลีบเลี้ยงกลีบนอกยาว 3-5 มิลลิเมตร รูปไข่หรือกลม มีขนตามขอบและปลาย กลีบเลี้ยง/กลีบดอกกลีบในยาว 4-8 มิลลิเมตร รูปไข่กลับถึง คล้ายสายหนัง เกสรเพศผู้ 40-80 อัน ผล ยาว 0.6-1 เซนติเมตร กลมถึงรูปไข่กว้าง ปลายห่อหรือแหลม แก่สีเขียวเข้ม พบในป่าพรุหรือใกล้น้ำ จ. ชุมพร ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤต. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า. ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี