

ตั้งหน้า

CALOPHYLLACEAE

Calophyllum tetrapterum Miq.

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 25 เมตร ลำต้นตรง มีพูพอนเล็กน้อยหรือเรียบเกลี้ยง เปลือก สีน้ำตาล เทาถึงดำเป็นร่องตื้น เมื่อตัด มีน้ำเลี้ยงสีน้ำตาลใส ใบรูปขอบขนานแกมรีถึงไข่กลับ กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนรูปกลมหรือสอบแคบ ขอบไม่เป็นคลื่น เนื้อบางหรือหนา เส้นกลางใบเป็นเส้นคมด้านบน ครึ่งล่างหรือ 2/3 ของใบมีร่องตรงกลาง เส้นใบชัด ก้านใบยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร เกือบถึง กิ่งอ่อนเล็ก มี 4 มุมหรือแบน เกือบถึง ยกเว้นตาใบ ดอก ช่อยาว 1.5-5 เซนติเมตร มี 3-11 ดอก มีขนกระจาย ก้านดอกยาว 0.5-2.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง/กลีบดอก (4)5-8 กลีบ เกือบถึงด้านนอก กลีบเลี้ยงกลีบนอกยาว 3-5 มิลลิเมตร รูปไข่หรือกลม มีขนตามขอบและปลาย กลีบเลี้ยง/กลีบดอกกลีบในยาว 4-8 มิลลิเมตร รูปไข่กลับถึงคล้ายสายหนัง เกสรเพศผู้ 40-80 อัน ผล ยาว 0.6-1 เซนติเมตร กลมถึงรูปไข่ กว้าง ปลายทู่หรือแหลม แก่สีเขียวเข้ม พบในป่าพรุหรือใกล้น้ำ จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การคณอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)