

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น สูงได้ถึง 8-15 ม. ใบ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 6-8.5 ซม. ค่อนข้างเล็ก ส่วนมากรูปรี บางทีรูปไข่หรือ กิ่งรูปไข่กลับ ปลายทู่หรือเรียวแหลมกว้าง โคนทู่หรือรูปหัวใจตื้น มักเบี้ยว ขอบเรียบ ยอดอ่อนมีเกล็ดเล็กๆ สีเงินแน่น ใบแก่ เนื้อสีเขียวเข้ม เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง ด้านล่างมีเกล็ดสีเงินแน่น เส้นใบ 3 เส้นออกจาก โคนใบ คูรีมยาวหนึ่งส่วนสี่ของใบ เส้นใบข้างเล็กเรียว 4-7 เส้น ค่อนข้างเป็นร่องด้านบน นูนชัดด้านล่าง ก้านใบเล็กเรียว ยาวได้ถึง 1 ซม. มีเกล็ดสีเทาอ่อนแน่น ดอก ยาว 4-5 ซม. (ยาวสองส่วนสามและสามส่วน สี่เท่าของใบ) สีขาวหรือออกเหลืองอ่อน าดดอกกว้าง 0.5-0.7 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. รูปขอบขนานแคบโคนมี ใบประดับแคบ 3 ใบ ไม้จัก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยก กว้าง 0.5-0.7 ซม. ยาว 2.5-4 ซม. คล้ายสายหนัง มีขน ด้านใน เป็นเกล็ดด้านบนนอก กลีบดอก 5 กลีบ แยกกว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 2.5-3.5 ซม. รูปใบหอก เกสรเพศ ผู้สมบูรณ์ 15 อัน ยาวได้ถึง 2.5 ซม. เกสรเพศผู้เป็นหมัน 5 อัน ยาวได้ถึง 3 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 3 ซม. ยอดเกสรเพศเมียบิต มี 5 อัน มีขนที่ ครึ่งถึงสามส่วนสี่ ด้านล่าง ผล กว้าง 3-5 ซม. ยาว 6-10 ซม. รูปขอบขนาน มีสันเป็นคลื่นชัด 5 สัน มีขนเมื่ออ่อน แก่เกลี้ยงและแข็ง ที่โคนไม่มีกลีบเลี้ยง เมล็ดกว้าง 1 ซม. ยาว 2-4 ซม. พบน้อยในป่าผลัดใบบนหินปูน และที่ต่ำค่อนข้างเปิดโล่ง

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โทมัส ฟินลา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

