

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ถึง 20 ม. พุ่มหนาทึบ เปลือก สีน้ำตาลอมเทา เรียบถึงแตกเป็นเกล็ด ใบ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-16 ซม. รูปขอบขนานแกมรีถึงใบหอกกว้าง ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแคบ ถึงที่พบน้อยโคนกลม เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 14-20 คู่ งามด้านบน ฐานด้านล่าง เส้นขอบใบ 1(2) เส้น โกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยชัดเกือบเท่าเส้นใบข้าง ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. กิ่งอ่อนสีน้ำตาล เกลี้ยงหรือเป็นสะเก็ด กิ่งเป็นมุมหรือแบน ดอก สีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นแตกแขนง (แบบช่อเชิงหลั่น) ยาว 3-10 ซม. แน่นถึงค่อนข้างโปร่ง ที่ปลายกิ่งและง่ามใบบนๆ ไม่มีก้านช่อดอก แขนงช่อกิ่งแบนแต่ไม่เป็นมุม ไม่มี ก้านดอก ถ้วยฐานดอกสูง 5-9 มม. รูปกรวยแคบ ก้านเรียวยาว 2-3.5 มม. กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาว 0.5-2 มม. เนื้อบาง ค่อนข้างติดทน กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด 3-7 มม. กลม เนื้อบาง เกสรเพศผู้และก้าน เกสร เพศเมียยาวได้ถึง 18 มม. ผล ขนาดประมาณ 2 ซม. ทรงกลมถึงรีกว้าง หรือแบนเล็กน้อย เป็นสันจางๆ พบกระจายกว้างในป่าดิบที่ต่ำ และป่าที่สูงจากระดับที่สูงถึง 1200 ม. ส่วนมากริมแม่น้ำ บริเวณน้ำกร่อย บางที่พบในป่าพรุ จังหวัดระนอง กระบี่



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

