


ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 15 ม. เปลือก สีน้ำตาลอมส้มถึงน้ำตาลแดงสด ลอกเป็นแผ่น บางคล้ายกระดาษ เปลือกในสีน้ำตาลแกมเหลือง บางมาก ใบ กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 4-10 ซม. รูปไข่ถึงรีแคบ หรือรูปใบหอก ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนรูปปลีกร้างหรือกลม เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวออกเทา เส้นใบ 10-14 คู่ เส้นชิดกัน เป็นแอ่งเล็กน้อยด้านบน ฐานรอยดัดด้านล่าง เส้นขอบใบ 1 เส้นห่างจากขอบใบประมาณ 2 มม. เส้นใบย่อยจากทั้งสองด้าน ก้านใบยาวประมาณ 0.7 ซม. เล็กเรียว กิ่งสีน้ำตาลอมส้มถึงน้ำตาลแดง เล็กเรียว เป็นมุมไม่ชัดในกิ่งอ่อน ดอก สีขาว กลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อแน่นแตกแขนง ยาว 2.5-5 ซม. ที่ง่ามใบและปลายกิ่ง แกนกลางและแขนงช่อเป็นมุมหรือเป็นปีกเล็กน้อย ไม่มีก้านดอก ออกเป็นกลุ่มแน่นที่ปลายของกิ่งข้างสั้น ถ้อยฐานดอกสูง 5-7 มม. รูปกรวยแคบ ก้านเล็กเรียว ยาว 2-3 มม. มีตุ่มเล็กๆ ด้านนอก กลีบเลี้ยง (4)5 กลีบ ยาวประมาณ 1 มม. รูปกลม กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด 2-3 ซม. เชื่อมติดกันในหลอด ร่วงเมื่อดอกบาน มีจุดต่อม 30-50 ต่อม เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย ยาว 8-12 มม. ผล ขนาด 0.5-0.7 ซม. ทรงรีกว้างหรือขอบขนาน ปลายทั้งสองด้านมนเล็กน้อย มีกลีบเลี้ยงโค้งเข้าไปใน ผลสีขาว เป็นรูปด้านใน มีเนื้อหวานกินได้ พบตามชายฝั่งที่เป็นหินหรือที่ค่อนข้างโล่ง ใกล้ลำน้ำ และบึงขึ้นแฉะ พบมากในภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (มทส.), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/10478871356/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

