

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น หรือไม้พุ่มเล็ก ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 8 ม. เปลือก สีเทาอ่อนถึงน้ำตาลออกเหลือง หรือสีเทา กลี้ยงหรือแตกเป็นแผ่นเล็ก และลอกออกเป็นแผ่น เปลือกในสีน้ำตาลออกเหลืองอ่อน ใบ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 6-14 ซม. ออกตรงข้าม รูปรีถึงรูปขอบขนานไข่แคบ ปลายเรียวแหลมสั้น โคนแหลม เนื้อคล้ายหนังบาง ขอบไม่เป็นคลื่น กลี้ยงทั้งสองเมื่ออ่อน มีตุ่มเป็นรูไม่ชัดที่ซอกเส้นใบ เส้นใบ 4-6 คู่ อยู่ห่างกัน เส้นใบย่อย จางทั้งสองด้านหรือบนด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1.2 ซม. เป็นร่องด้านบน กิ่งสีครีมถึงน้ำตาลอ่อน กลี้ยงเมื่ออ่อน แก่แตกสะเก็ด ใบรูปสามเหลี่ยมยาว 3-5 มม. ปลายเล็กเรียว เชื่อมกันเป็นกาบสั้น ดอก สีขาวออกเขียวอ่อนถึงสีเหลืองอ่อน สมบูรณ์เพศหรือดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแน่น (ช่อกระจุก) 5-12 ดอก ออกเหนือง่ามใบเล็กน้อย ส่วนมากออกที่ง่ามใบของทั้งคูใบ ไม่มีก้านดอก หรือก้านใหญ่ยาวได้ถึง 1.5 มม. กลีบเลี้ยง ยาว 1-2 มม. รูปถ้วย หลอดกลีบสั้น มีพู่รูปสามเหลี่ยม 4 พู่สั้น ยาวประมาณ 0.5 มม. หรือปลายเรียบแบน กลี้ยง กลีบดอกรูปดอกเข็ม หลอดกลีบดอกรูปทรงกระบอกยาวได้ถึง 4 มม. ปลายเป็นพู 4 พู ยาวได้ถึง 3 มม. บิดในตาดอก กางออกถึงโค้งกลับเมื่อดอกแก่ มีขนแน่นถึงกระจายในคอหลอด ดอก เกสรเพศผู้มี 4 อัน อับเรณู 5-7 อัน รูปขอบขนาน ยาว 1-2 มม. ก้านชูอับเรณูสั้น ติดที่คอหลอดดอก ตรงและโผล่พ้นหลอดดอก รังไข่ 2 ช่อง แต่ละช่องมี 2-3 ออวูล (เป็นหมันในดอกเพศผู้) ก้านเกสรเพศเมีย มียอดเกสรเพศเมียเล็กเรียว 2 พู โผล่พ้นกลีบดอก ผล กลมถึงรีกว้าง ขนาด 0.7-1 ซม. มีกลีบเลี้ยงติดที่ปลาย กลี้ยง สีเหลืองถึงส้มอมชมพูถึงแดง แก่ไม่แตก เมล็ดมีมุม 2-4(6) เมล็ด ไม่มีเยื่อหุ้ม อาจขึ้นบนเขาหินปูน พบในคาบสมุทรมลายูและในภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3950>