

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น

ขนาดกลางหรือใหญ่ สูง 15- 37 ม. เรือนยอดแตกแขนงมาก ต้นแก่เป็นร่องหรือมีพูพอน เปลือกสีน้ำตาลครีมหรือน้ำตาลเทาอ่อน หนามากกว่า 5 มม. ขรุขระหรือแตกเป็นเกล็ด เปลือกในสีครีมหรือน้ำตาล มีเส้นใย ใบเวียนแน่นที่ปลายกิ่ง เจริญไม่สิ้นสุด (มีตายอด) จนในที่สุดยาวได้ถึง 120 ซม. ใบย่อยมีได้ถึง 15 คู่ ออกกิ่งตรงข้าม กว้าง 4-13 ซม. ยาว 8-40 ซม. รูปไข่ถึงรี ปลายเรียวแหลมสั้น โคนรูปลิ้นเบี้ยว ใบอ่อนสีออกแดง ใบแก่หนาคล้ายหนัง เกลี้ยงหรือมีขนหนามบนเส้นกลางใบด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนอย่างน้อยบนเส้นใบหลัก ใบแห้งสีน้ำตาลแดง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 10-15 คู่ โค้งชัน เกือบขนดด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว 0.5-1.2 ซม. มีขนละเอียดสีฟางแล้วเกลี้ยง กิ่งใหญ่สีน้ำตาลเข้ม รอยแผลใบและช่องอากาศขัดมีขนสีสนิมแล้วเกลี้ยง บางทีมียางขาว ดอก สีขาวหรือเหลืองอ่อน เป็นช่อแตกแขนงหรือไม่แตก ยาวได้ถึง 50 ซม. ที่ซอกใบหรือเหนือซอกใบ มีขน ก้านดอกยาวได้ถึง 4 มม. ใบประดับย่อยรูปแถบยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มม. รูปประจักษ์ ขอบไม่จัก ด้านนอกมีขนกลีบดอก 3-5 กลีบ กว้างประมาณ 2.5 มม. ยาว 12-25 มม. เกือบเท่ากัน ซ้อนกันรูปช้อน ปลายแหลม หลอดเกสรเพศผู้ยาวได้ถึง 18 มม. ปลายจัก 6-9 พู พูแตกง่าม ยาวได้ถึง 2.5 มม. ด้านในมีขน อับเรณู 6-9 อัน ยาวประมาณ 2 มม. เกลี้ยงหรือมีขน รังไข่ 4 ช่อง จานฐานดอกรูปวงแหวน เกลี้ยง ขนาดประมาณ 1 มม. ก้านเกสรตัวเมียยาวได้ถึง 14 มม. มีขนยกเว้นปลาย ยอดเกสรตัวเมียกลมหรือรูปจาน ผล กลม โคนแคบ ยาวได้ถึง 1.5 ซม. เป็นช่อห้อย อ่อนมียางขาว สุกสีแดงอมส้ม แตก 3-4 เสี่ยง เมล็ดใหญ่สีน้ำตาลแดงถึงดำ เยื่อหุ้มสีแดงอมส้ม พบในป่าดิบที่ต่ำ จ. เพชรบุรีขึ้นไปถึงภาคเหนือของไทย พืชชนิดนี้เป็นชื่อ *C.siamensis* ในหนังสือ ไม้เมืองเหนือ

ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์, ฟินดา สิทิสันทร ก่องกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ 2 - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปพ. 2559. 792 หน้า

ภาพดอก : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plants_Chisocheton_cumingianus_DSCN8683_01.jpg

ภาพผล : <http://crassa.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/siphonodon-cela.html>

