

ชื่ออื่น : ยางกล่อง ยางขน ยางแดง ยางมดคัน ยางเยือง ยุงกระเบื้อง ยุงขน ยุงแดง, ยุงใบใหญ่ ยุงหัวเหวน

ไม้ต้น ขนาดใหญ่สูงได้ถึง 40 ม. เปลือกสีน้ำตาลปนเทา เรียบหรือแตกเป็นแผ่น ขนาดใหญ่ มักมีช่องอากาศกระจายทั่วไป เปลือกในสีเหลืองปนส้ม เนื้อไม้สีเหลืองอ่อน เป็นลักษณะทั่วไปของสกุลยาง ส่วนต่างๆ มีขนกระจุกยาวสีน้ำตาลแดงหนาแน่น ขยาวา 3-4 มม. ทูปีรูปแฉบ ยาวได้ถึง 15 ซม. ในรูปรีกว้าง ยาว 15-35 ซม. ปลายแหลมยาว โคนแหลม กลม หรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบหางลง 12-18 เส้น ก้านใบยาว 3-6 ซม. ช่อดอกยาว 3-5 ซม. มี 3-6 ดอก ก้านดอกสั้นมาก หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 ซม. กลีบยาวยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบสั้นยาว 3-5 มม. กลีบดอกยาว 4-6 ซม. ด้านนอกมีขนรูปดาวสั้นประปาрай เกสรเพศผู้ 30 อัน อับเรณูยาว 7-9 มม. หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลเรียง ยาว 2-2.5 ซม. ปีกยาวยาว 10-20 ซม. ปีกสั้นยาว 1.5-3 ซม. ปีกสั้นขอบพับกลับเล็กน้อย

พบที่พม่า กัมพูชา เวียดนามตอนใต้ คาบสมุทร猛烈 และสุมาตรา ในไทยพบทางภาคตะวันออก เสียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้งที่ค่อนข้างชื้น และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 550 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=4814&words=ยางขน>

ภาพประกอบ : ภาพถ่าย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพพม : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsLinkno=4814&words=ยางขน>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

