

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือก สีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลเทา หยาบ มีเกล็ดหนาเล็ก เมื่อแก่แตกและเป็นแผ่น ใบ ค่อนข้างเล็ก รูปรีกว้างถึงรูปลูกไข่ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 8-13 ซม. ปลายแหลมสั้น โคนสอบรูปลิ้มเป็นคลื่นหรือพับจีบ ใบแก่คล้ายหนัง เป็นเงาด้านบน ใบแห้งสีน้ำตาลช็อกโกแลตเข้ม เกือบทั้ง สองด้าน เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 9-12 คู่ เล็กเรียว เสนใบย่อยเป็นชั้นบันได เรียวและจาง ก้านใบยาว 2.5 ซม. เล็กเรียว เกือบทั้ง ใบกว้าง 1 ซม. ยาวประมาณ 8 ซม. ด้านนอกเกลี้ยงด้านในมีขนเส้นไหมแน่น กิ่งก้านเล็กเรียว (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม.) สีน้ำตาลเข้ม เกือบทั้งใบอ่อน ดอก ขนาด 3.5 ซม. สีครีม กลีบดอกครึ่งล่างมีขีดสีชมพูด้านใน ออกเป็นช่อยาวถึง 8 ซม. ที่ซอกใบหรือเหนือซอกใบ เกสรเพศผู้ ประมาณ 30 อัน อับเรณูเรียวเป็นแถบยาวประมาณ 3 เท่าของก้านชูอับเรณู ปลายมีรยางค์คล้ายเข็ม ยาวเท่า กับอับเรณู รังไข่เล็ก ขนนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียแข็ง สั้นกว่าเกสรเพศผู้ ผล ปีกใหญ่ 2 ปีก กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 8-14 ซม. เป็นแถบเรียวไปยังปลายทุ่ โคนพับเล็กน้อย เกือบทั้ง เส้นปีก 3-5 เส้นชัด ส่วนอีก 3 ปีกสั้นรูปกลม ยาว 0.6-1 ซม. โคนพับ ตัวผลกลมหรือรูปลูกข้างขนาดใหญ่ถึง 3 ซม. ไม่มีสัน เกือบทั้ง พบทั่วไปในป่าดิบ สูง 300 เมตร มักขึ้นใกล้ชายฝั่ง

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ/ลำต้น/ผลแก่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : <http://www.chm.frim.gov.my/Newsletter/125-29-2012.aspx>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

