

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ขนาดกลาง สูงถึง 30 ม. เปลือกสีเทาอ่อน เรียบถึงแตกเล็กน้อย ใบรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-8 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือแหลม ขอบเป็นคลื่น เกือบทั้งสองด้านหรือมีขนสีน้ำตาล ใบแห้งสีเขียวอมเหลืองอ่อน เส้นใบ 8-20 คู่ ระยะห่างเท่ากัน ค่อนข้างตรง โค้งและไปเชื่อมกัน ใกล้ขอบใบ เห็นชัดทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได จางด้านบน ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 0.7 ซม. เกือบทั้งกิ่งอ่อนมีขน ดอกสีเขียวอ่อนถึงเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแตกแขนงบนก้านช่อดอกยาว 1.5 ซม. ส่วนมากออกตามกิ่งใต้ซอกใบ บางทีตามกิ่งแก่ ก้านดอกยาว 1.7-2.5 ซม. เล็กเรียว มีขนละเอียด ใบประดับเล็ก รูปไข่ติดที่ครึ่งล่างของก้าน กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมกว้าง ยาวประมาณ 3 มม. ปลายทู่ บานออกหรือโค้ง กลับมีขนด้านนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกคล้ายสายหิ้งหรือรูปแถบ กว้าง 0.4 ซม. ยาว 2.5 ซม. กลีบวงนอกสั้นกว่ากลีบวงในเล็กน้อย ปลายแหลม ส่วนกว้างที่สุดอยู่ใกล้โคน แนบกันหลวมไม่บานออก ขนนุ่มทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ ยาว 1.3 มม. แกนอับเรณูแบน เกสรเพศเมีย ยาว 1.5 มม. ขนสั้น ยอดเกสรเพศเมียรูปขอบขนานมี 1 ออวูล ผล รูปขอบขนานกว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 ซม. ปลายและโคนกลมเกลี้ยง ก้านผลเล็กยาว 3.5 ซม. มีหลายผลอยู่บนก้านยาว 5-7 ซม. สีเหลืองถึงแดง มี 1 เมล็ด พบในป่าดิบชื้นเชิงเขาหินปูนสูง 100 ม. จ.สุราษฎร์ธานี ที่ภาคอื่นพบในป่าผลัดใบผสมป่าดิบ สูง 500-1,000 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพลำต้น : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพใบ : <http://flora-peninsula-indica.ces.iisc.ac.in/herbsheet.php?id=703&cat=7>

