

หญ้ารังไก่

Gahnia tristis Nees
วงศ์ CYPERACEAE

พืชล้มลุก ในวงศ์กก มีเหง้าแบบมีเนื้อไม้อยู่ใต้ดิน รากอ้วนสั้น แข็ง ลำส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน สูง 0.5-1.5 ม. มีข้อปล้อง กลวงเหมือนไม้ ใบเกิดเป็นกระจุกใกล้โคนกอ แผ่กว้างหุ้มลำ กาบใบสีน้ำตาลถึงน้ำตาลแดง ยาว 10-20 ซม. แผ่นใบ ขนาด 0.7-1.2 ซม. x 0.4-1.8 ม. เนื้อใบคล้ายกระดาษ ถึงคล้ายแผ่นหนัง ขอบใบมีขนสาก ปลายใบเรียวแหลม ดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนง ขนาด 2-3 x 14-40 ซม. ประกอบด้วยช่อดอกย่อยที่เกาะเป็นกลุ่ม 7-20 ช่อ ช่อดอกย่อยรูปไข่ถึงรูปรี 2-5 ซม. ก้านช่อสั้น แข็ง ห่อหุ้มด้วยแผ่นใบประดับ ดอกย่อยมีจำนวนมาก รูปกระสวย ขนาด 8-10 มม. เบียดกันแน่น กาบช่อดอกมีลักษณะเหมือนแผ่นกระดาษ มี 8-10 กาบ ระยะแรกสีน้ำตาลอมเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำ ดอกสมบูรณ์เพศ วงกลีบมีลักษณะเป็นขนแข็ง หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย มีอย่างละ 3 อัน ผลแบบเมล็ดแข็งติดเปลือก รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ขนาด 1.7-2 x 4-4.5 มม. เป็นทรงเหลี่ยมสามด้าน ผิวเรียบ สะท้อนแสง ผลอ่อนสีน้ำตาลซีด ผลแก่สีดำ



อ้างอิงข้อมูล : http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200026828

ภาพประกอบ : Flickr by mutolisp, www.plantphoto.cn, <http://hkcwv.org>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)