

ไม้ต้นเล็ก ไม่ผลัดใบ หรือผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 15 ม. (พบน้อยที่สูง 25 ม.) ลำต้นสีน้ำตาล กิ่งแผ่กว้าง เปลือกสีเทาอ่อนถึงน้ำตาลอมส้ม เนื้อแน่นแข็ง กลิ่นแรงคล้ายลávบด ใบ ยาว 15-30 ซม. ใบย่อย 2(3) คู่ออกตรงข้าม กว้าง 4/8 ซม. ยาว 7-14 ซม. พบน้อยที่กว้างถึง 15 ซม. ยาวถึง 25 ซม. รูปรีกว้างถึงรูปไข่ ปลายทู่สั้น โคนกลมหรือทู่ ยอดอ่อนสีแดงถึงสีชมพู มีขนละเอียด ใบแก่คล้ายกระดาษ สีเขียวเป็นมัน ด้านบน สีเขียวขุ่นด้านล่าง เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 5-8 คู่ โค้ง ชัดด้านล่าง ก้านใบย่อยของใบข้างยาว 5-8 มม. ก่อนข้างใหญ่ลำ ใบย่อยปลาย ยาวกว่ามาก ไม่มีหูใบย่อย หูใบยาว 3-4 มม. รูปขอบขนาน มีขนตามขอบ ร่วงเร็ว ดอก ยาว 1.2-1.5 ซม. สีขาวถึงสีม่วงหรือสีชมพูอมม่วง มักมีสีเหลืองหรือสีเขียว แซมด้านใน กลิ่นหอม ออกเป็นช่อเล็กเรียวยาว ไม่แตกกิ่ง ตามซอกใบ ยาว 12-20 ซม. ดอกออกเป็นคู่ก้านดอกยาวประมาณ 8 มม. เล็กเรียวยาว กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มม. รูปถ้วย ไม่จักเป็นซี่ฟัน (หรือจักเพียงตื้นๆ) สีม่วงแดง มีขนสีน้ำตาลแน่น กลีบดอกกลางกว้างประมาณ 1.2 มม. รูปค่อนข้างกลม ปลายแหลมสั้น หุ้มกลีบดอกอื่นเมื่อบานใหม่ๆ แต่ต่อ ไปโค้งไปด้านหลัง มีขนละเอียดสีน้ำตาลด้านนอก กลีบปีกข้างและกลีบคู่ด้านล่างยาวประมาณ 1 ซม. โคนกลีบชิดกัน เกสรเพศผู้มี 10 อัน เชื่อมเป็นแผ่นเดี่ยวล้อมรอบรังไข่ อันบนปลายและโคนแยก แต่ติดกับอันอื่นตรงกลาง รังไข่มีขนเล็กน้อย มีก้านยาว 1-2 มม. ผล กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 4-8 ซม. รูปขอบขนาน ปลายมีงอยโค้งสั้น โคนแคบ ไปยังก้านเล็กเรียวยาว 0.6-1.2 ซม. ป่องชัด (หนา 1-1.5 ซม. ตลอดฝัก ไม่ใช่ป่อง เฉพาะตรงเมล็ด เกลี้ยง อาจมีช่องอากาศกระจาย เนื้อหนามันถึงแข็ง มีเส้นใยด้านใน แก่แตก เมล็ด 1(2) เมล็ด ยาว 1.5-2.5 มม. รูปไข่แบนหรือรูปไต สีน้ำตาลเข้ม พบมากตามชายฝั่งทะเล และริมแม่น้ำทั่วภาคใต้ ใช้ชื่อ *Pongamia pinnata* หรือ *Derris indica* ในหนังสือพรรณไม้ เล่มเก่าๆ



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : http://www.qsb.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2374