

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่ม

ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. กิ่งใหญ่ตั้งขึ้น เรือนยอดค่อนข้างเปิด เปลือกสีเทาอ่อนถึงน้ำตาลออกเขียว เรียบ มีช่องอากาศใหญ่ เปลือกในมีจุดสีเหลืองออกน้ำตาล มีน้ำยางสีแดงประปราย ใบ ยาว 30-70 ซม. ออกเป็น กระจุกแน่นใกล้ปลายกิ่ง ใบประกอบขนนกปลายคี่หรือคู่ ใบย่อย 8-17 คู่ ออกกิ่ง ตรงข้าม ใบย่อยกว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 5-15 ซม. รูปไข่แคบถึงใบหอกแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ปลายสุดเป็นต่อม มักโค้งขัด โคนไม่เท่ากัน (แหลมด้าน หนึ่ง อีกด้านกลม) ขอบเรียบเป็นคลื่น ไม่มีก้านหรือ สั้นมาก ยอดอ่อนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองแน่น ใบแก่มีขนติด หนอย่น้อยใบเส้นใบ มักมีรอยบุ๋มทั้ง สองด้าน มีนวลโดยมีต่อมกระจายโดยเฉพาะที่ซอกเส้นใบด้านล่าง ใบแก่สีแดงสด เส้นใบ 8-15 เส้น แตกเป็น กว้าง เป็นแฉ่งตื้นด้านบน ก้านใบย่อยยาว 0.3-1.2 ซม. กิ่งลำ มีรอยแผลใบใหญ่ ไม่มีหูใบ ดอก ยาวประมาณ 0.5 ซม. สีเหลืองอ่อนหรือสีออกเขียว ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้น ออกเป็นช่อ แน่นแตกแขนง ยาว 20-60 ซม. ห้อยลงจากแกนกลางของใบเพิ่งเกิด ก้านดอกยาวประมาณ 4 มม. กลีบเลี้ยงยาว ประมาณ 1 มม. ปลายเป็นซี่ฟัน 5(6) ซี่ มีขน กลีบดอก 5(6) กลีบ แยกกัน กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 3-5 มม. เกสรหรือ เกือบเกสร ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้เล็กเรียว 10 อัน ยาว 3-6 ซม. ติดใต้จานฐานดอก มักมีขนแผ่กระจายที่โคน ดอกเพศ เมียมี่เกสรเพศผู้เป็นหมัน 10 อัน ยาว 1-3 มม. มีเกสรเพศเมีย 3 อัน (พบน้อย 2 หรือ 4) เกสรแบน กว้างประมาณ 1.5 มม. ยาวประมาณ 2.5 มม. แต่ละอันมีก้านเกสรเพศเมีย ยาว 1-1.5 มม. แยกกันหรือแนบติดกันที่โคน แต่เชื่อมติดกันที่ ปลาย มียอดเกสรเพศเมียอันเดียวรวมกัน แยก 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม ผล กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 5.8 ซม. เป็นช่อใหญ่ห้อย ผลเดี่ยว หรือ 2-3 ผลอยู่ด้วยกัน ก้านเรียว ยาว 0.8-2 ซม. ทรงขอบขนาน มีปีกบางมากล้อมรอบ เมล็ดเดี่ยว แบน เมื่ออ่อนสีชมพูมีเส้นบนผลจำนวนมาก เมื่อสุกแห้งคล้ายกระดาษ พบในป่าดิบหรือกึ่งป่าดิบ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Ailanthus0triphsa0\(Dennst.\)0Alston](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Ailanthus0triphsa0(Dennst.)0Alston)

