

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ลำต้นกลม ใบ ด้านล่างมีขนแบบขนแกะแน่น ใบออก เวียน สลับ เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปขอบขนานแกมรีหรือรูปไข่กลับ ถึงรูปใบหอกกลับ โคนรูปลิ้น เส้นใบโค้ง เส้นใบ ย่อยเป็นชั้นบันได ร่องแหวหรือขนานกับเส้นใบข้าง หูใบเล็กมาก ร่วงเร็ว ดอก สมบูรณ์เพศ ออกเดี่ยว หรือ เป็นกลุ่ม ตามง่ามใบหรือตามกิ่งใต้แผลใบ กลีบเลี้ยง 6 กลีบไม่พับ เรียงเป็น 2 วง วงละ 3 กลีบ กลีบดอก 6 แฉก บิดในดอกอ่อน หลอดกลีบดอกมีขนด้านใน ก้านดอกยาว 1.5-3 ซม. เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 12(-20) อัน สั้นและยาวติดสลับกัน เกสรหรือมีขน ไม่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน รังไข่ 3(6) ช่อง มีขนรูปกรวยหรือคล้ายจาน ก้านเกสรเพศเมียยาวและเรียว โผล่พ้นกลีบดอก ผล กลมถึงรีหรือขอบขนาน รูปไข่ถึงไข่กลับหรือกลม ขนาด 1.5-2 ซม. เมล็ด 1-3 เมล็ด มีแผลเป็นใหญ่(น้อยกว่า 1/3 ของเมล็ด)

พบในอินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงหมู่เกาะแปซิฟิก



ข้อมูลอ้างอิง: การ์ดเนอร์, ไมเคิล ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

