

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 6-30 ม. เปลือกสีเทาอ่อนหรือน้ำตาลอมเทา เรียบหรือหยาบเล็กน้อย มีช่องอากาศเล็ก เปลือกในสีส้มอ่อน ใบ ประกอบมี 3 ใบย่อย หรือใบประกอบขนนกยอเดี่ยว ใบย่อย 1-3 คู่ ออกตรงข้าม กว้าง 2-7 ซม. ยาว 8-20 ซม. มีรูปไข่แคบถึงใบหอกแกมรีปลายทั้งสองด้านหุบ โคนค่อนข้างเบี้ยว ตาดอกสีน้ำตาลเข้มเป็นมันและมีขนกำมะหยี่ ใบย่อยอ่อนมีขนสีน้ำตาลเข้ม ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน แล้วเกลี้ยงหรือมีขนบนเส้นใบ เส้นใบ 6-11 คู่ขนานบน โค้งและไปเชื่อมกันยังขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด ก้านใบย่อย 4-7 มม. ป่อง ไม่มีหูใบย่อย ก้านใบยาวเรียว โคนป่องเห็นชัด หูใบ ร่วงเร็ว ดอก ยาวประมาณ 1.8 ซม. สีขาวมีเขียวแซมตรงโคนของกลีบดอกกลางด้านใน ไม่มีกลิ่น เป็นช่อแตกแขนงแคบ ยาว 20-45 ซม. ที่ปลายกิ่งและซอกใบบนๆ ก้านดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงยาว 7-10 ซม. จักจี้ 1/3-1/2 ของกลีบ เป็นซี่ฟันแหลม 4 ซี่ มีขนสีน้ำตาลทองเข้มด้านบนนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกกลางยาวประมาณ 12 มม. โคนแคบคล้ายก้านยาวประมาณ 4 มม. รูปกลม โคนมี 2 พุคคล้ายติ่งหูและปุ่มเล็กๆ 2 ปุ่ม กลีบดอกทุกกลีบเกลี้ยง เกสรเพศผู้ มี 10 อัน เชื่อมกัน 1 กลุ่ม สลับกันสั้นยาว รังไข่ยาวประมาณ 10 มม. มีขนสั้นไหม รูปแถบแบน โคนมีฐานฐานดอกเป็นวงแหวน ผล กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 14-23 ซม. รูปแถบหนัง โค้งเล็กน้อย ปลายมีจะงอย แบนหนาตามข้อต่อ แต่ไม่ใช่ปีก สุกสีน้ำตาลทองถึงน้ำตาลช็อกโกแลตเข้ม มีขนแน่นสีทอง แก่แตก 2 เลี่ยง บิด มี 2-7 เมล็ด กว้าง ประมาณ 1.6 ซม. ยาวประมาณ 2 ซม. รูปไข่ถึงกลมแบน พบตามป่าดิบชื้น พบน้อยในภาคใต้ มีรายงานที่ จ. สงขลา

ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ ฟินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ปานาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/42141375724>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

