

ไม้พุ่ม รอเลื้อย หรือไม้ต้นขนาดเล็ก แยกเพศต่างต้น มีขนสั้นนุ่มตามข้อดอก ก้านดอก และตาดอก ใบรูปไข่กว้าง ยาว 5-9 ซม. ปลายแฉกตื้น ๆ โคนใบตัดหรือเว้าตื้น แผ่นใบด้านล่างมีนวล เกือบหรือมีขนสั้นนุ่ม เส้นใบ 9-11 เส้น ก้านใบ ยาว 2-4 ซม. ข้อดอกแบบข้อกระจะแยกแขนงสั้น ๆ ยาวได้ถึง 5 ซม. ดอกหนาแน่น ใบประดับขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม ก้านดอกยาว 1-2 ซม. ใบประดับย่อยติดบนก้านดอก ตาดอกรูปรี ยาว 6-10 มม. ฐานดอกสั้น กลีบเลี้ยงสั้นกว่ากลีบดอกเล็กน้อย ปลายแยกเป็น 3-5 แฉก ตื้น ๆ ดอกสีขาว กลีบรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 ซม. ก้านกลีบสั้นมาก เกสรเพศผู้ 10 อัน เรียง 2 วง สั้นกว่ากลีบดอก วงนอกยาวกว่าวงในเล็กน้อย อับเรณูยาวประมาณ 2 มม. เป็นหมันในดอกเพศเมีย รังไข่มีขนสั้นนุ่ม มีก้านสั้น ๆ ยอดเกสรเพศเมียรูปจาน ฝักรูปแถบแบน ยาว 20-25 ซม. ปลายมีจะงอย มี 10-30 เมล็ด เมล็ดรูปขอบขนาน

พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ชวา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ภาคใต้ถึงชุมพร ขึ้นตามชายป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร ดอกแก่ปวดท้อง แก้บิด ใบมีสรรพคุณกระตุ้นกำหนัด แก้ไข้ เปลือกใช้พอกแผลสด



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Bauhinia0malabarica0Roxb.>

ภาพประกอบ : http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2447#lg=1&slide=0



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

