

เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น

Accipiter gularis (Temminck & Schlegel, 1844)

Accipitridae

ตัวผู้ : ตาแดง คล้ายเหยี่ยวนกกระจอกเล็ก แต่ลำตัวด้านบนสีอ่อน ไม่มีเส้นกลางคอหรือมีแต่จางมาก ออกและท้องสีน้ำตาลแกมส้ม เข้มกว่าเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน หรือเห็นเป็นลายขวางถี่ๆ แถบทางด้านบน แดงกว่าอีกเห็น 4 แถบ ตัวเมีย : ขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ตาเหลืองหรือแกมส้ม คล้ายเหยี่ยวนกกระจอกเล็ก แต่เส้นกลางคอเล็กกว่า ออกไม่มีลายขีด ลายขวางที่อก ท้อง และสีข้างละเอียดกว่า สีน้ำตาลเข้มแกมเทา สีหัวและหลังไม่ต่างกันมาก นกวัยอ่อน : ยากที่จะแยกจากเหยี่ยวนกกระจอกเล็ก แต่เส้นกลางคอบางกว่า ขีดที่อกน้อยกว่าและไม่เป็นสีดำ ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าโปร่ง ชายป่า สวนผลไม้ และสวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 2,135 เมตร

