

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 15-25 เมตร ลำต้นจะแตกกิ่งก้านสาขามาก เปลือกสีเทาอมน้ำตาลเข้ม กิ่งเล็กกลมสีน้ำตาลอมแดงคล้ำ มีรอยเหี่ยวย่นเล็กน้อย ทรงพุ่มเป็นรูปครึ่งวงกลมแผ่ออกกว้าง ใบเป็นใบรวม มีใบย่อย 2-4 คู่ ก้านใบระหว่างใบย่อยมีขนาดใหญ่ กลม สีน้ำตาลอมแดง ฐานก้านใบหนา รูปรี ใบเป็นรูปไข่ยาวหรือรูปไข่หัวกลับ ขอบใบเรียบสีเขียวอมเหลืองหรือสีนวล เส้นกลางใบขนาดใหญ่ ใต้ใบจะมีคลื่นเล็กน้อย ดอก มี 2 ลักษณะ คือ ช่อดอกเพศผู้ เป็นดอกเงาะที่มีดอกตัวผู้ทั้งช่อดอก และอีกลักษณะ คือ ดอกสมบูรณ์เพศ หรือที่เรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศ เป็นดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ใน ดอกเดียวกัน ผล รวมกันอยู่เป็นช่อ ติดอยู่บนก้านช่อดอก ผลค่อนข้างกลม สีแดง บางพันธุ์สีแดงปนเหลือง ขนาดของผลยาวประมาณ 3.5-8 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขนสั้นยาวขึ้นกับชนิดพันธุ์ แต่โดยทั่วไปยาวเฉลี่ย 0.5-1.8 เซนติเมตร เนื้อในใส อ่อนนุ่ม หรือเป็นสีขาวอมเหลือง ห่อหุ้มเมล็ดอยู่ เมล็ด ลักษณะรูปแบน ยาวรี หรือบางครั้งกลม เป็นรูปไข่ ผิวนอกของเมล็ดจะหุ้มด้วยผิวเปลือกบางๆ สีน้ำตาลอ่อน



ข้อมูลอ้างอิง: <http://nates.psu.ac.th/researchcenter/tropicalfruit/fruit/rambutan.htm>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



Nephelium cuspidatum Blume var. *eriopetalum* (Miq.) Leenh.

เงาะขนสั้นใบใหญ่

SAPINDACEAE

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10(36) เมตร เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดง เรียบหรือมีช่องอากาศเล็ก ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู้ โคนเท่ากัน ขอบเรียบ ยอดอ่อนมีขนแน่น ใบย่อยไม่มีติ่มใบ ดอก สมมาตร ดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่คนละต้น (พบน้อยต้นเดียวกัน) ออกเป็นช่อ กลีบเลี้ยง 5 (พบน้อย 4 หรือ 6) กลีบไม่เท่ากัน รูปสามเหลี่ยม โคนเชื่อมกัน กลีบดอก 4-6 กลีบหรือไม่มี เกสรเพศผู้ 4-10 อัน ล้อมรอบด้วยจานฐานดอกวงแหวน รั้งไข่กันสั้น มักมีติ่มและขน ผล 1(2) พู มีหนามนุ่มฟู (คล้ายผลเงาะ) ผลมีหนามยาวมากกว่า 2 เซนติเมตร ผลกว้าง 2-4 เซนติเมตร บางทีเกลี้ยง หรือมีติ่ม แก่แตก เมล็ดมีเนื้อหุ้ม พบในภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง: การ์ดเนอร์, ไชยอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพทึบใบ : https://www.flickr.com/photos/ys_yech/7447198350/in/photostream/

ภาพทรงพุ่ม/ผล : <https://seedsofborneo.com/2018/12/19/nephelium-cuspidatum-primate-dispersed/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)




เงาะใบยาว

Nephelium laurinum Blume

SAPINDACEAE

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10(36) เมตร เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดง เรียบหรือมีช่องอากาศเล็ก ใบย่อยขอบแบน มีขนเส้นไหมด้านล่าง เส้นใบอาจ 16-24 คู่ ดอกสีขาวหรือออกชมพู กลีบเลี้ยงโคนเชื่อม ไม่มีกลีบดอกหรือมี 5 กลีบ สั้นกว่ากลีบเลี้ยง มีขนคล้ายขนแกะที่ครึ่งล่าง เกสรเพศผู้ 7(8) อัน ผล กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 3 เซนติเมตร ทรงขอบขนาน สีเหลืองถึงแดง เปลือกบาง พบที่จังหวัดตรัง ยะลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : <http://134.76.19.22/sumatra/taxa/Sapindaceae/Nephelium%20laurinum>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



เงาะใบเรียว

Nephelium juglandifolium Blume

SAPINDACEAE

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 90 เซนติเมตร ใบ(1)3-7 คู่ ดอกออกเป็นช่อเป็นแบบ pseudoterminal กลีบเลี้ยงยาว 1.5-2 มิลลิเมตร เชื่อมติดกันเล็กน้อยหรือบางครั้งเชื่อมติดกันได้ 35% ของกลีบ กลีบดอกไม่มี เกสรเพศผู้มี 7-8 อัน รังไข่ 2 ช่อง ผล รูปทรงรีค่อนข้างแบน ขนาด 3.5-5×2.5×2 เซนติเมตร เกือบ มีลักษณะเป็นตุ่มหยาบปกคลุม ตุ่ม หรือหูดที่กล่าวถึง เรียงตามยาวแนวผล ตุ่มมีรูปร่างสามเหลี่ยมปลายหูด หรือแบน ยาวได้ถึง 4 มิลลิเมตร



ข้อมูลอ้างอิง : อ้างอิง portal.cybertaxonomy.org/flora-malesiana

ภาพประกอบ : <http://134.76.19.22/sumatra/taxa/Sapindaceae/Nephelium%20juglandifolium>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



เงาะป่า (อีกริม)

Rinorea anguifera Kuntze

VIOLACEAE

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร แตกกิ่งดกสพรั่ง เปลือก มีสีค่อนข้างน้ำตาลอมเทาจนถึงสีน้ำตาลดำ ผิวเรียบหรือขรุขระเล็กน้อย เปลือกในมีสีส้มอ่อน ใบ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 7-24 เซนติเมตร มีรูปร่างเป็นรูปไข่กลับหรืออาจ พบเป็นรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนทู่ สองด้านไม่เท่ากัน ขอบใบจักซี่ฟันเล็กใหญ่สลับกัน เห็นชัด ใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลหนาแน่น ใบแก่ด้านบนสีเขียวหม่น ด้านล่างสีอ่อนกว่า และมีขนนุ่มบนเส้นใบ เส้นแขนงใบ 8-17 คู่ เรียงขนานกัน เส้นใบย่อยเป็นแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 0.2-1 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลติดแน่น หูใบยาว 5-10 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยม มีสันด้านนอกชัด ดอกสีขาวหรือสีครีมอมเหลือง ออกเป็นกลุ่ม มีถึง 20 ดอก ไม่มีก้านช่อรวม ออก ตามง่ามใบ หรือบนกิ่งข้างสั้นๆ ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยง ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร สีเขียวจนถึงสีเหลืองมัว มีขนสีน้ำตาล กลีบในแคบกว่าและ ยาวกว่า กลีบนอก กลีบดอกยาว ประมาณ 6 มิลลิเมตร แบนคล้ายเข็มขัดหรือเป็นรูปตัวเอส (S) ปลายโค้ง ด้านนอกตรง เส้นกลางมีขนสีเงิน อับเรณูมี รยางค์ 1 อัน ก้านเกสรเพศผู้เล็ก เรียว ไร้ขน ก้านเกสรเพศเมียมีขน ยกเว้นบริเวณใกล้ปลายยอด ผล กลม ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน อยู่ในกลุ่มก้านที่พันกัน เป็นก้อนคล้ายมอสส์ (คล้ายผลเงาะ) มีกลีบเลี้ยงติดแน่นที่โคน เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนมีเมล็ด สีน้ำตาลอ่อน เป็นมัน 1-2 เมล็ด ยาว 4-7 มิลลิเมตร พบขึ้นทั่วไป เป็นพืชในเรือนยอดชั้นรองในป่าดิบชื้นต่ำ อาจขึ้นได้ถึง 600 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561: 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ทั้งใบยาว

Litsea machilifolia Gamble

LAURACEAE

ลักษณะทั่วไป ทั้งใบยาวสามารถสูงได้ถึง 36 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 72 เซนติเมตร ไม่มีใบเลี้ยง ใบสลับกันแบบเดี่ยว เป็นรูปขนนกเกลี้ยงขนาดเล็ก ด้านล่างมีสีค่อนข้างขาว ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร มีสีเขียวซีด อยู่ตรงซอกใบ เป็นช่อขนาดเล็ก ผลยาวประมาณ 14 มิลลิเมตร สีเขียว ผลมีเมล็ดเดี่ยวอยู่บนฐานดอก อยู่ใต้ใบผสมผลัดใบที่ระดับความสูง 300 เมตร ชอบอยู่บนไหล่เขาหรือสันเขาที่มีดินทราย แต่อาจพบบนเขาหินปูนในป่าที่ยังไม่ถูกรบกวน



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.asianplant.net/>

ภาพประกอบ : ภาพถ่ายต้น/ใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Litsea+machilifolia>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ชะเง้อน้ำ (จ๊กจั่น)

Millettia xylocarpa Miq.

FABACEAE

ไม้ต้น เล็กถึงกลาง ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร กิ่งเล็กเรียว มีใบแผ่แบนระนาบเดียวสีเขียวอ่อน เปลือก สีเทาอ่อน เรียบหรือแตกสะเก็ด เปลือกในสีน้ำตาลอมเหลือง เป็นเส้น กิ่งแก่แข็งแรง ใบ ยาว 12-20 เซนติเมตร ใบย่อย 3-5 คู่ ออกตรงข้าม กว้าง 1.8-4 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร พบน้อยที่กว้างได้ถึง 6 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร ใบคู่ล่างเล็กที่สุดและรูปรีแกมรูปไข่ คู่บนๆ รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปใบหอกกลับ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม ยอดอ่อนสีเขียวอ่อน มีขนสีอ่อนแน่น ใบแก่คล้ายกระดาก มีขนดัดแน่นอย่างน้อยบนเส้นกลางใบด้านล่าง เส้นใบ 5-8 คู่ โค้ง เชื่อมเป็นวงจางใกล้ขอบ เป็นร่องเล็กน้อยด้านบน ก้านใบย่อยยาว 2-6 มิลลิเมตร มีขน ไม่มีหูใบย่อย ก้านใบยาว 3-4.5 เซนติเมตร หูใบยาว 3-8 เซนติเมตร โค้งเล็กน้อย เห็นชัดเมื่อยังอ่อน บางทีติดทน ดอก ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร สีขาวอาจมีสีเขียวแซม หรือสีอมชมพู ออกเป็นช่อไม่แตกกิ่ง ยาว 5-15 เซนติเมตร ตามซอกใบอ่อนใกล้ปลายกิ่ง มีขนละเอียด ก้านดอกยาว 4-8 มิลลิเมตร เล็กเรียวออกเดี่ยวหรือเป็นคู่บนปมเล็กๆ (ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร) ตามซอกใบประดับ คล้ายใบเล็กๆ กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร จักเป็นซี่ฟันต้น สีน้ำตาลแดง มีขนแน่น กลีบดอกกลางขนาด 7-12 มิลลิเมตร รูปไข่กว้างเกลี้ยงหรือมีขน กลีบปีกข้างรูปขอบขนาน ปลายกลมและมีขน ชิดกับกลีบคู่ล่างที่โคน เกสรเพศผู้มี 10 อัน เชื่อมเป็นแผ่นเดียว ยาวค่อนข้างเท่ากัน รังไข่มีขนคล้ายเส้นไหม แน่น มีก้านสั้น ก้านเกสรเพศเมียยาว ผล กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร รูปใบหอกแกมรูปแถบ ปลายมีจะงอยสั้นค่อยๆ แคบไปยัง 1/3 ของส่วนล่าง อาจไม่มีก้าน แบน หนาและเป็นสันระหว่างข้อ บางแข็ง เกลี้ยง แก่แตก เมล็ด 2-5 เมล็ด ยาว 12-16 มิลลิเมตร รูปรีเบี้ยว แบน (หนา 1-2 มิลลิเมตร) สีดำมันพบกระจายถึงพบมากในป่าที่ต่ำ โดยเฉพาะริมแม่น้ำ มักจะเอนออกไปจากฝั่ง



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การันเดอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองานดา ชยามฤต ไม่ไถบาคใต้เล่ม2 - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559, 792 หน้า

ภาพประกอบ : <http://www.fca16mr.com/webblog/blog.php?id=1846>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



จิกจั่นฝักปีก

Millettia pterocarpa Dunn

FABACEAE



ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



จักหัน

Orophea polycarpa A.DC.

ANNONACEAE

ไม้ต้น สูง 11 เมตร ลำต้นและกิ่งเล็กเรียว เปลือกเรียบสีน้ำตาลหรือเทา เปลือกในสีเหลืองอ่อนมีเส้นสีน้ำตาลตามแนวตั้งประสานกัน มีเส้นใย ใบ ขนาดต่างกันบนกิ่งเดียวกัน รูปใบหอก กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนแหลม เนื้อคล้ายหนังบางด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอมเทาอ่อน กลี้ยง เส้นใบ 5-6 คู่ โค้งและเชื่อมติดกันใกล้ขอบ จากด้านบนสู่ด้านล่าง ก้านใบยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ต่อไปเกลี้ยงและ เป็นสีน้ำตาล ดอก ยาวประมาณ 0.7 มิลลิเมตร สีขาวอมเขียวอ่อน ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามซอกใบหรือเหนือซอกใบ ก้านดอกรวมยาว 2-6 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 3-7 มิลลิเมตร ก้านทั้งสองเกลี้ยง กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ปลายหุบ โคนเชื่อมกัน มีขนด้านนอกและตามขอบ กลีบดอกวงนอกรูปไข่ ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ปลายแหลม มีเส้นหลายเส้นเห็นชัด มีขนเฉพาะที่ขอบวงใน ยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยมเพชร ปลายหุบหรือแหลมเล็กน้อย โคนมีก้านแคบสั้นกว่าตัวกลีบแนบกันแต่ไม่เชื่อมกัน ไม้บาน ออกเมื่อแก่มีขนตามขอบด้านในไปยังโคน มีต่อมน้ำหวานแนวราบ 2 ต่อมน ขอบไม่เป็นคลื่น ไม่มีเนื้อเยื่อสีดำล้อม เมื่อแห้ง เกสรเพศผู้ 6(9) อันเรียง 1 วง ไม่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน เกสรเพศเมียเกลี้ยง มี 12(18) อัน รูปขอบขนาน มี 2 ออวูล ผล กลมยาว 1-1.5 เซนติเมตร สีเขียวถึงสีเหลือง กลี้ยง ก้านผลยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีถึง 12 ผล มี 1-2 เมล็ด พบในป่าดิบ สูงถึง 700 เมตร และบนเขาหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชยอน ไม้ภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : ธรินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561, 880 หน้า
ภาพประกอบ : http://www.cpb.go.th/database/botanic_book%20ful%20option/search_detail.asp?botanic_id=2577



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



จันทน์

Diospyros dasyphylla Kurz

EBENACEAE

ไม้ต้น

สูงถึง 20 เมตร ใบ รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรีหรือไข่กลับ กว้าง 3-7 เซนติเมตร ยาว 8-18 เซนติเมตร ปลายแหลม ถึงแหลมกว้าง โคนกลมหรือค่อนข้างรูปหัวใจ มักเบี้ยว ใบแก่เนื้อคล้ายกระดาษแข็ง มีขนบนเส้นกลางใบด้านบน ด้านล่างมีขนกำมะหยี่ติดแน่น เส้นใบ 9-12 คู่ โค้งแล้วเริ่มจางหายไป หรือเชื่อมกันกลางๆ ก่อนถึงขอบใบ เป็นร่องด้านบน บนด้านล่าง เส้นใบย่อยบนด้านล่าง ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร มีขนแน่น กิ่งอ่อนมีขนแน่น เมื่อแก่เกลี้ยง สีเทาหมักเป็นปุ่มปม ดอกเพศผู้ เป็นช่อกระจุกยาว 0.7-1.2 เซนติเมตร มี 3-10 ดอก ออกได้ระดับใบ ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงยาว 2-3 มิลลิเมตร รูปประฆังกว้าง ปลายจักลึกเกือบถึงโคนกลีบ เป็นแฉกแผ่กว้าง 4 แฉกซ้อนทับกัน มีขนด้านนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกยาว 7-10 มิลลิเมตร สีครีม โคนเป็นหลอด หรือคล้ายดอกเข็ม ปลายจักลึกครึ่งกลีบ เป็นแฉก 4 แฉก มีขนด้านนอก เกสรเพศผู้ 12-16 อัน ก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่เป็นหมันมีขน ดอกเพศเมียออกเดี่ยวหรือมี 3 ดอก ก้านดอกยาว 2-3 มิลลิเมตร มีขน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้ รังไข่มีขน ผล ขนาด 4-7 เซนติเมตร ก้านผลใหญ่ ยาว 0.5 เซนติเมตร ผลกลมหรือแบนเล็กน้อย มักเป็นปุ่ม ปลายทั้งสองข้างกลมหรือปุ่ม มีขนกำมะหยี่เมื่ออ่อน แก่เกลี้ยง สุกสีส้มสด เปลือกหนา ภายในชุ่มน้ำ เมล็ดมีน้อยกว่า 8 เมล็ด กลีบเลี้ยงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เซนติเมตร เห็นไม่ชัด รูปจานรองถ้วย จักถึงโคนเป็นแฉกแผ่ออกหรือโค้งกลับ 4 แฉก ไม้พื้จับหรือเป็นคลื่น มีขนกำมะหยี่ด้านนอก พบน้อยที่ร่มเงาในป่าดิบที่ต่ำ มักขึ้นตามเชิงเขาหินปูน ผลได้ชื่อว่าเป็นพิษ



ข้อมูลอ้างอิง : ไกรคนอร์, โสมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558, 768 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

