

## เหียงพรวางแอ

*Carallia brachiata* (Lour.) Merr.

RHIZOPHORACEAE

ชื่อพื้นเมือง : แก็ก วงคต วงคต องคต ต่อไล่ สันพรวางแอ คอแห้ง สีฟัน

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ มีความสูงประมาณ 25-30 เมตร และสูงได้ถึง 35 เมตร ลำต้นเปลา ตั้งตรง เป็นทรงเรือนยอดทรงพุ่มรูปกรวยกว้างทึบ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมเทา ผิวเรียบ และมีรูอากาศมาก หรือเปลือกต้นอาจหนาแตกเป็นร่องลึกตามยาว อาจพบลักษณะคล้ายรากค้ำจุน แบบ Prop root เป็นเส้นยาว หรือจะออกเป็นกระจุกตามลำต้นหรือส่วนของโคนต้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามสลับกับตั้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปไข่กลับ หรือเป็นรูปใบหอกกลับ ปลายใบมนมีติ่งเล็กแหลม ส่วนฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบ มีความกว้างประมาณ 4-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร แผ่นใบเกลี้ยงหนาและเหนียว หลังใบสีเขียวเข้มเป็นมันหนา ท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกเป็นช่อแยกแขนงแบบ กระจุกสั้น ๆ มีดอกย่อยจำนวนมากและมีขนาดเล็กเรียงตัวกันแน่นเป็นช่อกลม โดยจะออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง แตกแขนงเป็น 4 กิ่ง กลีบดอกแยกอิสระจากกัน กลีบดอกมีสีครีม ลักษณะเป็นรูปกลม ขอบกลีบหยักเว้าพับจีบ โคนสอบแหลมเป็นก้านติดเรียงสลับกับกลีบเลี้ยง ดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนเป็น 2 เท่าของกลีบดอกและยาวไม่เท่ากัน ผลสดแบบมีเนื้อ ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ขนาดเล็ก และออกเป็นกระจุก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-10 มิลลิเมตร ผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ปลายผลคล้ายมงกุฏ ผิวผลเป็นมัน มีเนื้อบาง สีเขียว ห่อหุ้มอยู่ ผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกเป็นสีแดง และจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเมื่อสุกจัด ในผลมีเมล็ดสีน้ำตาล หรือดำ มีเนื้อเยื่อหนาสีส้ม



ข้อมูลอ้างอิง : <https://medthai.com/เหียงพรวางแอ>

ภาพประกอบ : ภาพผล : <https://medthai.com/เหียงพรวางแอ>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ชงโค

*Bauhinia purpurea* L.

FABACEAE

ชื่ออื่น : กะเฮอ ชงโค สะเปชี เลี้ยวดอกแดง เลี้ยวหวาน

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร ใบรูปเกือบกลม กว้างและยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ปลายแฉกเล็กเกือบกึ่งหนึ่ง แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย เส้นโคนใบข้างละ 4-6 เส้น ก้านใบยาว 2-3 เซนติเมตร ช่อดอกมี 6-10 ดอก ก้านดอกหนา ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ใบประดับย่อยติดประมาณกึ่งกลางก้านดอก ตาดอกรูปกระบอง มีสันนูน 4-5 สัน ยาว 3-4 เซนติเมตร มีขนกำมะหยี่หนาแน่น ฐานดอกยาว 0.7-1.2 เซนติเมตร ดอกสีชมพูหรือม่วง กลีบรูปใบหอก ยาว 3-5 เซนติเมตร ก้านกลีบยาว 0.5-1 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาวเท่า ๆ กลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน 3-4 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ที่เป้นหมัน 5-6 อัน รูปเส้นด้าย ยาว 0.6-1 เซนติเมตร รังไข่มีขนกำมะหยี่หนาแน่น ก้านเกสรเพศเมีย โค้งงอ ยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ฝักรูปแถบ ยาว 20-30 เซนติเมตร มี 10-15 เมล็ด

เข้าใจว่ามีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบเก็บจากฟิลิปปินส์ ในไทยพบปลูกตามสองข้างถนนและสวนสาธารณะ พบน้อยที่กระจายในธรรมชาติ ส่วนชงโคที่ปลูกเป็นไม้ประดับและไม่ติดผล เกสรเพศผู้ 5 อัน เป็นหมัน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเกาะฮ่องกง ชื่อสามัญคือ Hong Kong orchid tree ชื่อวิทยาศาสตร์คือ *Bauhinia x blakeana* Dunn เป็นลูกผสมของ *B. purpurea* L. และ *B. variegata* L. คำระบุชนิดตั้งตาม Sir Henry Arthur Blake ผู้ปกครองเกาะฮ่องกงช่วงปี ค.ศ. 1989-1903



ข้อมูลอ้างอิง : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Bauhinia0purpurea0L>

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Bauhinia+purpurea>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



Syz  
ชมพู่นก



ข้อมูลอ้างอิง : โกร์ตันเนอร์, โทมัส ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



## ชมพู่<sup>น้ำ</sup>(ชมพู่<sup>ค้าง</sup>)

*Syzygium siamense* (Craib) Chantar. & J.Parn.

MYRTACEAE

ชื่ออื่น : ชมพู่<sup>ค้าง</sup> ชมพู่<sup>น้ำ</sup> หัวปลอก

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 เมตร ใบเรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ ยาว 9-28 เซนติเมตร โคน กลมหรือเว้าตื้น มีเส้นขอบใน 1 เส้น ก้านใบยาว 3.5-8 มิลลิเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่งหรือช่อใบใกล้ปลายกิ่ง มี 2-6 ดอก ก้านดอกยาว 3-5 มิลลิเมตร ฐานดอกยาว 1-1.7 เซนติเมตร ไม่มีต่อม ก้านดอกเทียมยาว 5-6 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 3-6.5 มิลลิเมตร โคนหนา ขอบบาง ดอกสีชมพู แดง หรือเหลือง มี 4 กลีบ ขนาด 1.4-1.7 เซนติเมตร โคนหนา ขอบบาง มีต่อมหนาแน่น เกสรเพศผู้วงนอกยาว 2-3 เซนติเมตร รังไข่มี 2 ช่อง ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-2.7 เซนติเมตร

พบที่พม่าและคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค โดยเฉพาะทางภาคใต้ ส่วนมากขึ้นริมลำธารในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Syzygium0siamense0\(Craib\)0Chantar.010J.0Parn.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Syzygium0siamense0(Craib)0Chantar.010J.0Parn.)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Syzygium0siamense0\(Craib\)0Chantar.010J.0Parn.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Syzygium0siamense0(Craib)0Chantar.010J.0Parn.)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมใหญ่แน่นทึบ คลุมลำต้นไว้เป็นส่วนใหญ่ เปลือกเรียบสีเทาหรือน้ำตาลอ่อนปนเทา ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ก้านช่อยาว 1.5-8 เซนติเมตร ที่ปลายก้านช่อมีข้อใบแขนงด้านข้าง 1 คู่ ติดตรงกันข้ามข้อใบแขนงยาว 8-29 เซนติเมตร แต่ละช่อมีใบย่อย 2-4 คู่ ขึ้นตรงกันข้าม ใบย่อยรูปมนแกมรูปขอบขนาน ขนาดแตกต่างกัน กว้าง 3-9 เซนติเมตร ยาว 3-20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมฐานใบมนและเบี้ยวเล็กน้อย แผ่นใบเกลี้ยง ไม่มีขน ดอก สีขาว ขนาดเล็กจำนวน 3-6 ดอก ออกบนช่อกลมเล็กๆ ซึ่งแตกแขนงมาจากข้อใหญ่ ยาว 7-18 เซนติเมตร ช่อดอกโปร่งออกตามง่ามใบ ของใบแก่ที่หลุดร่วงไปแล้วกลีบรองกลีบดอกเล็กมาก มี 5 กลีบ โคนกลีบติดกัน กลีบดอกมี 5 กลีบ ผลแบนยาว รูปบรรทัด มีส่วนคอดเว้าระหว่างเมล็ด กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ตัวฝักบิดเวียนเป็นเกลียวไปทางเดียวกัน ผิวสีน้ำตาลคล้ำหรือสีน้ำตาลอมม่วง ฝักแก่ผนังจะแตก อ้าออก ผนังหนาคล้ายแผ่นหนัง ขอบขึ้นตามชายป่าดิบชื้นทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ และยังพบขึ้นห่างๆ ตามชายป่าดิบ บนพื้นที่ที่ค่อนข้างชุ่มชื้นใกล้ลำธารบนเทือกเขาตะนาวศรีทางภาคตะวันตกเฉียงใต้



ข้อมูลอ้างอิง : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น สูง 24 เมตร เปลือก สีน้ำตาลเข้มแตกเป็นแผ่นเล็ก เปลือกในสีเหลืองอ่อนถึงสีชมพูอมส้ม มียางสีครีมหรือเหลืองบางๆ ใบ รีถึงรูปใบหอก กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 14-18 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนแคบ เนื้อคล้ายหนังบาง มีจุดสีดำเล็กและลายด้านล่าง เส้นใบเล็กตรงขนานกัน โคนและเชื่อมกันใกล้ขอบใบ หนูน ละเอียด ก้านใบเล็กยาว 1.5 เซนติเมตร กิ่งสีเทาอ่อน ดอก ดอกเพศผู้ยาว 1-1.3 เซนติเมตร สีเหลืองถึงครีม เป็นช่อมี 3-9 ดอก บนปุ่มเล็กแข็งบนกิ่งใต้ตาใบ ก้านดอกเล็กยาว 0.8-1.4 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 3 มิลลิเมตร สีครีม เนื้อนุ่ม กลมโค้ง ด้านนอกเป็นสันเมื่อเป็นตาดอก กลีบดอก 4 กลีบ กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 6-9 มิลลิเมตร คล้ายสายเข็มขัด ปลายหุบหรือแหลม ครึ่งบนโค้งกลับ เกสรเพศผู้จำนวนมาก อยู่แน่นเป็นก้อนครึ่งวงกลมตรงกลางดอก ก้านสั้น ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยวหรือ 3-5 ดอก ตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า กลีบดอกกว้างและหนากว่า ยอดเกสรเพศเมีย 5-7 แฉก มีปุ่มเล็ก ผล ยาว 4-5 เซนติเมตร กลม ปลายยกขึ้น ยอดเกสรเพศเมียเป็นแผ่นคล้ายจาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร มีสันจากลูกสีเหลืองถึงส้ม เมล็ดใหญ่ 5-7 เมล็ด เนื้อบาง พบในป่าที่ต่ำใกล้ชายฝั่ง หรือตามลำน้ำ สันเขา เขาหินปูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : โชนอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปพ.2558. 768 หน้า  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ชะมวง

*Garcinia cowa* Roxb. ex DC.

CLUSIACEAE

ชื่ออื่น : หมากโมก กะมวง มวงส้ม กานี

ไม้ต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง-ใหญ่ สูง 10-30 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์ กรวยคว่ำ พุ่มใบย่อยลงมา เปลือกนอกสีเทาดำ แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ เปลือกในสีเหลือง มียางสีเหลือง ถ้ากั๊วไว้เป็นสีชมพูอมเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่แกมรูปหอก ฐานแหลมหรือมน ผิวใบเกลี้ยง ขอบเรียบ ใบอ่อนสีแดงอมเหลือง ขนาด 2-3.5 x 6-15 เซนติเมตร ใบอวบหนา ดอก ออกตามซอก ก้านใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง ชมพู กลีบเลี้ยง 10 กลีบ ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้เป็นช่อกระจุกสั้น ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว เกสรเพศผู้จำนวนมาก เกสรเพศเมียแบน แยกเป็นจัก 4-8 เหลี่ยม ดอกออกกุ่มๆ ก้านดอกสั้น ผล ผลแบบ berry เนื้อนุ่มหลายเมล็ด ทรงกลม มีร่องตามยาว 6-8 ร่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-10 เซนติเมตร ผลสุกมีสีเหลืองอมส้ม ผลแห้งสีดำ ผลแก่เมษายน-มิถุนายน พบในป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าพรุ ป่าเต็งรัง



ข้อมูลอ้างอิง : [http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com\\_dofplant&view=showone&id=11](http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=11)

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



## ชะมวงเล็ก

*Garcinia parvifolia* (Miq.) Miq.

CLUSIACEAE

ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม สูง 18 เมตร เปลือก สีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นแผ่นเล็กหรือเป็นร่องไม่เท่ากัน เปลือกในสีชมพูถึงแดงเข้ม มียางสีเหลืองข้นหรือครีมบางๆ ใบ เล็ก รูปรีถึงใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลม โคนรูปกลม เนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวด้านบน แหล่งน้ำตาลแดง เส้นใบเล็กประมาณ 8 คู่ ห่างกัน 7-15 มิลลิเมตร เป็นมุมแหลมแคบ มีเส้นแขนงตรงไปยัง ขอบใบ เส้นบนๆเชื่อมกัน นูนละเอียด เส้นใบย่อยเป็นร่างแหแน่นอน ก้านใบยาว 1 เซนติเมตร กิ่งสีเทาอ่อนถึง สีน้ำตาลอมเทา ไม่เป็นสัน ดอกเพศผู้เล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 เซนติเมตร สีครีมถึงเหลืองอ่อน ออกเป็น ช่อหลวมมี 2-9 ดอก ตามซอกใบหรือบนปุ่มเล็กแข็งตามกิ่งใต้ตาใบ ก้านดอกใหญ่ ยาว 2-6 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบยาว 3.5 มิลลิเมตร สีครีมรูปไข่ กลีบดอก 4 กลีบ กว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 5 มิลลิเมตร กลมโค้งถึงขอบ ขนานกว้าง ปลายหุบหรือกลม บานออก โคนโค้งกลับ เนื้อนุ่ม ขอบบาง เกสรเพศผู้ 15-30 อัน อยู่แน่นเป็นก้อน ครึ่งวงกลม ตรงกลางดอกบนก้าน เป็นแท่งสั้นอับเรณู 4 เซลล์ ก้านชูอับเรณูสั้น ไม่มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อกระจุกมี 3-5 ดอก ตามซอกใบ หรือใต้ตาใบ ก้านดอกใหญ่ยาว 2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 2 มิลลิเมตร ไม่เท่ากัน สีเขียวอมเหลืองรูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 4 กลีบยาว 3 มิลลิเมตร เกสรเพศเมียเป็นหมัน 4 อัน ยอดเกสรเพศผู้เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร คล้ายจาน จักเป็นแฉกตื้น 6 แฉก หรือเป็นชายครุยมีตุ่มเล็ก ผล ยาว 2-3 เซนติเมตร รูปไข่หรือกลม ปลายมน พบน้อยยอดแบน มีเกสรเพศเมียเล็กซ่อนอยู่ในแอ่งเล็ก โคนมน กลีบเลี้ยงไม่ชัด ไม่มีร่องหรือสัน เกือบ เปลือกบาง สุกสีเหลือง ถึงสีส้มหรือแดง เมล็ดเล็ก 3-5 เมล็ด เนื้อหนา พบในป่าดิบสูง 600 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์เดนอร์, โจนอน ฟินดา สิริสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์ทป. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพดอก : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=2929>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัดกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ไม้ต้น สูงถึง 35 เมตร ผลัดใบ มีพุ่มหนาทึบสูงถึง 4 เมตร ตามอายุ เปลือก สีครีมถึงสีน้ำตาลอมเทาหรืออมแดง เรียบหรือ เป็นร่องตื้นหรือขรุขระ เพราะมีช่องอากาศใหญ่ เนื้อเป็นคอร์ก เปลือกในสีชมพูหรือสีแดง มีแถบสีขาวนวล มีน้ำเลี้ยงสีครีม ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกสลับ เป็นกระจุกใกล้ปลายกิ่งใหญ่ มีใบย่อย 4-7 คู่ ติดกัน ตรงข้าม รูปไข่แคบถึงรูปใบหอก กว้าง 2.5-6 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนรูปร่างกลมหรือกึ่งรูปหัวใจ เบี้ยว ขอบเรียบ ยอดอ่อนสีแดง มีขนสีสนิมหนาแน่น ใบแก่มีเนื้อใบ และขนมีหลายแบบ มักมีขนกระจายถึงขนแน่น โดยเฉพาะบนเส้นใบทั้งสองด้าน หายากที่เกลี้ยง ใบแก่สีแดงสด เส้นใบ 7-12 คู่ ฐานด้านล่าง ด้านบนเห็นชัด เส้นใบย่อยเป็นร่างแหหรือชั้นบันไดไม่ชัด มักเห็นชัดทั้งสองด้าน กิ่งใหญ่และก้านใบมีขนกระจายถึงขนแน่น หรือพบน้อยที่ค่อนข้างเกลี้ยง ก้าน ใบของใบข้างยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แบนหรือกลม (ไม่เป็นร่อง) ด้านบนก้านใบ ปลายยาวถึง 3.5 เซนติเมตร ดอก สีขาวเหลือง หรือแดงเข้ม ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้นกัน ออกเป็นช่อแตกแขนงเปิด ยาวถึง 50 เซนติเมตร ห้อยที่ปลายกิ่ง มีขนละเอียดหรือขนสีสนิม มักมีดอกเมื่อผลัดใบ ก้านดอกยาว 2-6 มิลลิเมตร มีขนละเอียด กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร แยกเป็น พู่ลึกมากกว่าสองส่วนสามของกลีบ มี 4 พู่ไม่เท่ากัน รูปสามเหลี่ยม มักมีขนแน่นโดยเฉพาะด้านนอก จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ภายหลังจากเกิดการปฏิสนธิในดอกเพศเมีย กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่หรือขอบขนาน ยาว 3-5 มิลลิเมตร ซ้อนกัน มีขนสั้นด้านนอก ด้านในเกลี้ยง ในดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้สมบูรณ์ 4 อัน ยาว 2.5-4 มิลลิเมตร ติดรอบขอบจานฐานดอกแบนนูน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร มีรังไข่เป็นหมันเล็กอยู่ตรงกลาง ในดอกเพศเมียมีเกสรเพศผู้เป็นหมัน ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร รังไข่รูปโคน ขนาดประมาณ 1.5 มิลลิเมตร มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 3(4) แฉก ผล มีปีกคล้ายแถบหนังสีแดงสด 4 ปีก (เกิดจาก พูกลิบลี้น) กว้าง 0.8-1.2 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร โคนเชื่อมเป็นท่อน ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีขนกระจาย อย่างน้อยเมื่ออ่อน ตัวผลกลมหรือกึ่งรูปไข่ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ปลายเป็นยอดแหลมสั้น มีขนกำมะหยี่ พบทั่วไปในป่าภาคใต้ โดยเฉพาะในป่าผลัดใบบนเขาหินปูน และพบในป่าดิบที่ต่ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ ฉบับ - พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ช้างแหกใหญ่

*Neesia synandra* Mast.

MALVACEAE



ภาพประกอบ: www.tlbc.frim.gov.my



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

